

Barbotage

Behandeling van kalkafzetting
in de pezen van de schouder

The logo for Ijsselland ziekenhuis, featuring a stylized house icon above the text 'ijsselland' and 'ziekenhuis' below it.

ijsselland
ziekenhuis

Hier gaat het om u.

www.ysl.nl

Patiënteninformatie

In deze folder

Wat is een barbotage?	3
Voor de behandeling	4
De behandeling	4
Na de behandeling	5
Vragen & antwoorden	6
Heeft u nog vragen	7

Wat is een barbotage?

De orthopedisch chirurg heeft bij u een barbotage voorgesteld. Een barbotage is een behandeling van uw schouder. Daarbij wordt de kalk, die zich in uw pezen heeft afgezet, aangeprikt, gespoeld en zo mogelijk opgezogen. Een barbotage wordt uitgevoerd wanneer er een **chronische ontsteking** bestaat van één van de pezen in de schouder. In de ontstoken pees is hierbij een verkalking ontstaan.

Bij 75 à 80% van de patiënten zorgt deze behandeling ervoor dat de kalk verdwijnt (in de loop van enige weken) en de klachten tot een aanvaardbaar laag niveau worden teruggebracht.



Voor de behandeling

- Als u overgevoelig bent voor bepaalde medicijnen (corticosteroiden, lidocaïne), moet u dit tijdig aangeven.
- U kunt na de behandeling niet zelf naar huis rijden. Vraag daarom iemand om u naar huis te rijden.
- Het is aan te raden om bovenkleding te dragen die u gemakkelijk aan en uit kunt trekken. U kunt gewoon eten, drinken en uw medicijnen innemen.

Verder zijn er geen speciale voorbereidingen nodig.

Waar melden?

U meldt zich op de dag van uw afspraak met uw identiteitsbewijs (ID-kaart, paspoort of rijbewijs) bij een aanmeldzuil in onze centrale hal. Als u de stappen van aanmelden heeft doorlopen, krijgt u een ticket. Daarop vindt het routenummer van de afdeling Radiologie waar u moet zijn.

De behandeling

U wordt opgehaald en naar de ruimte gebracht waar de behandeling plaatsvindt. Tijdens de behandeling ligt u met een ontblote schouder op uw rug op de onderzoekstafel. Met behulp van echografie wordt gekeken waar de kalk zich precies bevindt.

Vervolgens wordt de huid op deze plek ontsmet en verdoofd. Dit gebeurt door het inspuiten van een vloeibare pijnstiller. Deze werkt binnen een paar minuten, zodat de behandeling bijna meteen kan beginnen.

Met behulp van echografie wordt hierna de kalk met een naald meerdere malen aangeprikt en doorboord. Op deze manier brokkelt de kalk in kleine stukjes en kan deze sneller door het lichaam afgevoerd worden. Ook wordt de doorbloeding gestimuleerd, wat het herstel van de pees bevordert.

Tot slot wordt soms door de naald een ontstekingsremmend middel ingespoten in het gebied rond de aangedane pees.

De behandeling duurt ongeveer 30 minuten.

Na de behandeling

- Na afloop wordt er een pleister op de schouder geplakt.
- Tot een week na de behandeling kan de schouder erg pijnlijk zijn. Dit is normaal. U kunt dan voorgeschreven of al aanwezige pijnstillers nemen.
- Fysiotherapie is slechts zelden nodig na deze behandeling.
- Bewegen en een normaal gebruik van de schouder en de arm na de behandeling is belangrijk voor het herstel van de functie van de schouder.

Na 2 tot 3 weken komt u bij uw behandelend orthopedisch chirurg op controle.

Vragen en antwoorden

Wanneer mag ik weer autorijden?

U mag autorijden als uw schouder weer betrouwbaar aanvoelt en dus krachtig en stabiel genoeg is. Dit is doorgaans na een paar dagen.

Wanneer mag ik weer zwaar tillen of sporten?

De eerste 2 weken na de behandeling mag u niet zwaar gaan tillen of sporten, tenzij u zeer weinig klachten ondervindt.

Wanneer mag ik weer werken?

Dat hangt af van het soort werk wat u doet. Bij schouder-belastend werk is een periode van 2 weken aan te raden.

Hoe lang kan mijn schouder pijnlijk blijven?

Tot een week na de behandeling kan uw schouder pijnlijk zijn. Als uw schouder gezwollen en rood wordt, in combinatie met koorts, neemt u dan contact op met het ziekenhuis.

Belangrijk om te weten!

Ondanks alle zorg die besteed wordt aan de behandeling en nazorg kunnen er soms toch **complicaties** optreden zoals:

- Pijn die niet genoeg afneemt na de behandeling en de revalidatieperiode.
- Infectie van de schouder.
- Het ontstaan van een nieuwe verkalking.

Krijgt u hier last van?

Neem dan contact op met de aanvrager / uw behandelaar.

Tot slot

Wij doen ons best om u zoveel mogelijk op tijd te helpen.
Wilt u zo vriendelijk zijn om op tijd aanwezig te zijn voor het onderzoek?

Als u verhinderd bent voor het onderzoek, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk laten weten? De opengevallen plaats kan dan voor een andere patiënt gebruikt worden.

Heeft u nog vragen?

Neem dan op werkdagen contact op met de afdeling Radiologie: tel. **010 – 258 5975**.

Verder nog van belang

Deze folder ondersteunt de mondelinge informatie die u van arts of verpleegkundige krijgt. Vraag het hen als u meer wilt weten over onderzoek, operatie, gevolgen, risico's of andere behandel mogelijkheden.

Ontdek Mijn IJsselland

De toegang tot uw eigen gegevens, dossier, afspraken en vragenlijsten [mijn-ijsselland](#)

Aanbevolen websites

Betrouwbare medische informatie, aanbevolen door onze zorgverleners [aanbevolen-websites](#)

IJsselland Folders

Al onze patiëntenfolders kunt u opzoeken en lezen in onze Folder Web App [folder app](#)

