Coloscopie (poliklinisch)

Voorbereiding thuis met **Pleinvue**

ijsselland ziekenhuis

Hier gaat het om u.

www.ysl.nl

Patiënteninformatie

Inhoudsopgave

1. **Wat is een coloscopie** 2

2. **Voorbereidingen thuis** 5
   - 4, 3 en 2 dagen vóór het onderzoek
   - 1 dag vóór het onderzoek
   - op de dag van het onderzoek

3. **Waar meldt u zich** 12

4. **Het onderzoek** 14

5. **Na het onderzoek – de uitslag** 17

6. **Wanneer contact opnemen** 19

1.


Wat is een coloscopie

Bekijk het filmpje hierover via onderstaande link

MDL centrum IJsselland



Op advies van uw behandelend arts zult u een coloscopie ondergaan. Een coloscopie is een onderzoek waarbij de dikke darm heel nauwkeurig op de aanwezigheid van afwijkingen wordt geïnspecteerd. Dit gebeurt met behulp van een videocameraatje dat in een lange, dunne, buigzame slang is ingebouwd.
Een dergelijk instrument heet een endoscoop.



Het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten.

Om ervoor te zorgen dat u zo weinig mogelijk hinder van het onderzoek ondervindt, krijgt u -via een infuusnaaldje in uw hand of arm- een pijnstiller én een medicijn dat het bewustzijn verlaagt toegediend. U bent **NIET** onder narcose.
Om na te gaan of deze medicatie veilig is voor u, heeft u vooraf een gesprek met een intake verpleegkundige om samen een vragenlijst door te nemen. Deze vragenlijst kan ook digitaal naar u worden toegezonden.

Soms wordt bij dit onderzoek gelijktijdig ook een behandeling uitgevoerd, bijvoorbeeld het verwijderen van eventueel aanwezige poliepen.

Het onderzoek wordt verricht door een maag-darm-lever arts. Dit is een ervaren specialist, die daarvoor een specifieke opleiding heeft gehad.

Belangrijk

- Als u suikerziekte heeft, moet u dit ruimschoots vóór het onderzoek kenbaar maken bij de aanvragend arts of de intake-verpleegkundige. We plannen uw afspraak dan bij voorkeur in de ochtend. Let daar zelf ook op als uw afspraak gemaakt wordt! Soms wordt u opgenomen om uw diabetes te reguleren. Uw voorbereiding is dan anders.
- Indien u **bloedverdunners** gebruikt dan dient u dit altijd **vóór** het onderzoek door te geven aan de aanvragend arts of de intake-verpleegkundige.
- Als u bij de trombosedienst onder controle bent, brengen wij hen op de hoogte. Mogelijk dat u tijdelijk met de bloedverdunners moet stoppen. Na de coloscopie hoort u van de arts wanneer u weer mag (her)starten met de bloedverdunners.
- Wanneer u **ijzertabletten** gebruikt, moet u hier 10 dagen voor het onderzoek mee stoppen.

Belangrijk voor mensen met een stoma!

- Als u een colostoma heeft, raden wij u dringend aan vóór het innemen van de laxeermiddelen **opvangmateriaal** te gebruiken **dat u kunt legen**. Bent u niet in het bezit van een dergelijk stomazakje? Dan kunt u dit -zonder kosten- ophalen bij de stomaverpleegkundige in het ziekenhuis.Verder raden wij u aan om **extra ondergoed** mee te nemen naar het ziekenhuis. Het kan namelijk voorkomen dat u zich een keer moet verschonen omdat lekkage kan optreden tijdens de voorbereiding of omdat tijdens het onderzoek nog wat ontlasting uit de stoma komt. Neemt u ook **extra eigen stomamateriaal** mee.

2.

Voorbereidingen thuis

Voor een zo goed mogelijk resultaat is het belangrijk om voorafgaand aan het coloscopie onderzoek uw darm helemaal leeg/schoon te maken.

Hiervoor zijn voorbereidingen thuis noodzakelijk.

Voorbereidingsschema ‘schone darmen’

4,3,2 dagen voor het onderzoek	**1 dag voor het onderzoek** **Starten met Pleinvue**	**Op de dag van uw onderzoek**
Datum: …….	Datum: ……	Datum: ……
Vezelbeperkt dieet	**Tot 13:00 v**ezelbeperkt dieet **Daarna tussen 13:00 en 18:00 uur** alleen nog maar **glad vloeibaar eten** **Vanaf 18.00 uur** Niets meer eten, alleen heldere dranken drinken.	**5 uur vóór de start van uw onderzoek:** → Drink een kopje thee → 2e dosis **Pleinvue:** Zakje A + B samen oplossen in 500 ml koud water. Drink iedere 20 minuten 1 glas. Neem kleine slokjes. → Drink hierna nog minimaal 500 ml heldere drank. Om de 10 minuten 1 glas.
	Om 18.00 uur: → 1e dosis **Pleinvue:** 1 zakje oplossen in 500 ml koud water. Drink iedere 20 minuten 1 glas. Neem kleine slokjes. → Drink hierna nog minimaal 500 ml heldere drank. Om de 10 minuten 1 glas.	**3 uur vóór de coloscopie:** **U blijft vanaf nu helemaal nuchter.** Dat betekent dat u niets meer mag drinken, roken en eten.
Lees de instructie op pagina 7 en 8	**Lees de instructie op pagina 9**	**Lees de instructie op pagina 10**

Dag 4, 3 en 2 voor het onderzoek

Vezelbeperkt dieet

Vanaf 4 dagen voor het onderzoek start u met een **vezelbeperkt dieet**. Dit betekent dat u bepaalde vezelrijke voedingsbestanddelen niet mag eten.

Wat mag u NIET eten

- Volkoren/meergranen graanproducten, zoals
  bruin brood met zaden, roggebrood, volkoren- en meergranenpasta, zilvervliesrijst, maiszemelen, muesli, havermoutpap.
- Vezelige groenten, zoals
  asperges, bleekselderij, zuurkool, snijbonen, sperziebonen, prei, doperwten, peulvruchten, taugé, mais, champignons, tomaten, ui, knoflook, spinazie (ongekookt), andijvie (ongekookt), paprika's en rauwkost.
- Pit- of vezelrijke fruitsoorten, zoals
  onrijp fruit, sinaasappel, grapefruit, ananas, mango, mandarijnen, mineola, kiwi, bramen, druiven, appel, peer, aardbeien, tomaat, gedroogde (zuid)vruchten zoals dadels, vijgen, krenten, rozijnen, kokos, smoothies, vruchtensappen met vruchtvlees.
- Alle nootsoorten, alle pinda's en zaden, pindakaas, sesamzaad, maanzaad, zonnebloempitten.
- Tussendoortjes zoals koekjes, popcorn, mueslirepen.

Gelukkig zijn er ook heel veel voedingsmiddelen die niet vezelrijk zijn en die u dus wel mag eten tijdens de voorbereiding.

Wat mag u bijvoorbeeld WEL eten

- Graanproducten, zoals
  beschuit, wit- of licht bruinbrood, toast(naturel), cornflakes, pannenkoek of poffertjes (NIET volkoren of meergranen), pasta (NIET volkoren of meergranen), custard pap, rijstebloem pap, vermicelli.
- Beleg, zoals
  Margarine, chocoladepasta, honing, stroop, jam zonder pitjes en fruit, (smeer)kaas, beenham, rosbief, kipfilet, rookvlees, kalkoen.
- Gaar gekookte groenten, zoals
  aardappelen, gaar gekookte wortelen, bloemkool, lof, andijvie, spinazie, jonge bietjes, broccoliroosjes.
- Fruit, zoals
  zacht, rijp fruit, fruitconserven zonder pitjes, vezels en schil, appelmoes, vruchtenmoes en banaan.
- Vlees, zoals
  soepballetjes, licht gebraden mager vlees, biefstuk, runder-tartaar, hamlap, varkenshaas, kip of vis (zonder vel), beenham, rosbief, gekookt ei.
- Desserts, zoals
  vla, pudding, kwark, yoghurt, cake, chocolade (zonder nootjes), snoep, ijs.

Probeer tijdens de voorbereidingen thuis zoveel mogelijk uw normale dagelijkse activiteiten te blijven doen.
Uw darmen raken bij beweging namelijk makkelijker en sneller het vocht kwijt.

1 dag voor het onderzoek
Starten met Pleinvue

STAP 1: vanaf het ontbijt tot 13.00 uur

Het ontbijt: vezelbeperkt eten.

STAP 2: van 13.00 tot 18.00 uur

U mag alleen nog maar glad vloeibaar eten zoals vla, yoghurt (zonder stukjes erin), gezeefde soep, gezeefde bouillon, ijs.

STAP 3: van 18.00 tot 20.00 uur

Pleinvue oplossen:

Dosis 1 (1 zakje, mangosmaak) van de Pleinvue lost u op in 500 ml water. Laat dit dan 10 minuten staan tot het goed is opgelost, dan opdrinken→ Drink iedere 20 minuten 1 glas. Neem kleine slokjes. Hierna drinkt u nog minimaal 500 ml heldere dranken, zoals water, thee, appelsap, gezeefde bouillon, gele/oranje limonadesiroop → Iedere 10 minuten 1 glas.

Tips bij een goede voorbereiding:

- Drinken met een rietje dan komt de vloeistof minder in contact met de smaakpapillen op uw tong.
- Het water vooraf goed koelen.
- Probeer zo veel mogelijk te bewegen, dit stimuleert de darmen tot activiteit waardoor u sneller leegspoelt.
- Vochtige toilet doekjes verzachten,
- Afleiding tijdens het drinken helpt, bijv. lezen, muziek luisteren.

Pleinvue heeft een sterk laxerende werking. In deze fase van het laxeren kan het nodig zijn om incontinentiemateriaal te gebruiken.

BELANGRIJK:

Gebruik tijdens het laxeren **GEEN vaseline** op of rond de anus. Dit is schadelijk voor de scoop die wordt gebruikt. U mag wel Sudocrem® gebruiken.

De dag van het onderzoek

Volg onderstaande voorbereidingen

Let op:

Vindt uw onderzoek in de ochtend plaats, dan moet u (heel) vroeg opstaan om de Pleinvue klaar te maken en op te drinken.

Wij verzoeken u op de dag van het onderzoek geen bodylotion te gebruiken. Trek ook iets aan wat comfortabel en niet te strak zit. U mag uw bovenkleding tijdens het onderzoek aanhouden.

BELANGRIJK VOOR MENSEN MET EEN STOMA

Wilt u op de dag van het onderzoek voldoende **eigen stomamateriaal** meenemen naar het ziekenhuis?

STAP 1: 5 uur vóór de start van het onderzoek

- Maak dosis 2 van de Pleinvue klaar (fruitdranksmaak). Los zakje A en B samen op in 500 ML water. Laat dit 10 min. goed oplossen voordat u het opdrinkt → Drink iedere 20 minuten 1 glas. Neem kleine slokjes.
- Drink daarna nog minimaal 500 ml **heldere dranken,** zoals water, thee, appelsap, gezeefde bouillon, gele limonade → Iedere 10 minuten 1 glas.

STAP 2: tot 3 uur voor het onderzoek

- U mag alleen **heldere dranken** zoals water, thee, appelsap, gezeefde bouillon, gele/oranje limonadesiroop.

STAP 3: 3 uur vóór de start van het onderzoek

- vanaf nu blijft u nuchter.
  U mag dus **niets meer drinken, eten en roken**!



Zorgt het laxeren en nuchter zijn voor hoofdpijn?
Paracetamol innemen met water mag!

De darmreiniging is gelukt wanneer de ontlasting er als heldere lichtgele vloeistof er uit ziet.



3.

Waar meldt u zich op de dag van het onderzoek



Op de afgesproken tijd meldt u zich met uw identiteitsbewijs bij de aanmeldzuil van het **Maag-, Darm- en Levercentrum (MDL-centrum)**, route 99. Nadat u de stappen van aanmelden heeft doorlopen, krijgt u een afspraakticket.





Nadat u zich hier heeft gemeld, kunt u plaatsnemen in de wachtkamer. Daar wordt u door een verpleegkundige van de dagverpleging van het MDL-centrum opgehaald.



4.

Het onderzoek

Bekijk het filmpje hierover via onderstaande link

MDL centrum IJsselland



Wanneer u op MDL-dagverpleging aankomt, bereiden wij u voor op uw coloscopie.

- Wij vragen u uw onderkleding uit te trekken en een broek van het ziekenhuis aan te trekken. Vervolgens neemt u op het onderzoeksbed plaats. Uw bovenkleding mag u aanhouden.
- Daarna wordt u aangesloten op een bloeddruk- en hartslagmeter d.m.v. plakkers op uw borst en buik.
- Vervolgens krijgt u een infuusnaaldje in uw arm of hand.
- Via het infuusnaaldje krijgt u medicatie toegediend dat het bewustzijn verlaagd, zodat u zo weinig mogelijk hinder van het onderzoek ondervindt.
- Wanneer u aan de beurt bent, wordt u met uw bed naar de behandelkamer gereden.
- Gedurende het onderzoek krijgt u extra zuurstof toegediend via uw neus.



Het onderzoek zelf duurt ongeveer 20 minuten.

De endoscoop wordt voorzichtig via uw anus in uw dikke darm gebracht. De beelden worden op een scherm weergegeven waardoor de arts bepaalde afwijkingen meteen kan zien.

Soms wordt bij dit onderzoek gelijktijdig ook een behandeling uitgevoerd, bijvoorbeeld het verwijderen van eventueel aanwezige poliepen. De meeste van deze extra behandelingen zijn niet pijnlijk.



Risico's van het onderzoek

- Complicaties van het onderzoek zelf komen zelden of nooit voor. Wanneer tijdens het onderzoek echter één of meerdere poliepen moeten worden verwijderd, neemt ook het risico van het onderzoek toe.
- De kans bestaat dat na deze ingreep een **nabloeding** ontstaat. Deze stopt bijna altijd vanzelf, maar toch is dan een opname in het ziekenhuis noodzakelijk.
- Heel zelden komt het voor dat na een verwijdering van een poliep een **gaatje in de darm** ontstaat (een perforatie). Hiervoor moet meestal operatief worden ingegrepen.

5.

Na het onderzoek



Na het onderzoek wordt u teruggebracht naar de dagverpleging van het MDL-centrum om bij te komen van het onderzoek. Ongeveer een half uur na het onderzoek krijgt u iets te eten.

Het is mogelijk dat u na verloop van tijd met de ontlasting een bandje of een clip verliest die tijdens de coloscopie gebruikt is tijdens het verwijderen van poliepen.

U ontvangt via de mail een nazorgfolder van de verpleegkundige.

Informatie voor de begeleider
Tijdens de voorbereiding van het onderzoek, het onderzoek zelf en de nazorg is het niet toegestaan dat uw begeleider aanwezig is. Hij of zij kan eventueel wachten in de wachtruimte van het MDL-centrum.

Wanneer kunt u worden opgehaald
Anderhalf uur na afloop van het onderzoek kunt u bij het MDL-centrum worden opgehaald. Uw begeleider kan zich melden bij de balie.

Let op
Het is wettelijk niet toegestaan om zonder begeleiding het ziekenhuis te verlaten omdat uw reactie- en denkvermogen tijdelijk minder is. De rest van de dag van uw onderzoek mag u ook niet alleen deelnemen aan het verkeer. U mag niet autorijden of fietsen.

De uitslag

Voordat u de afdeling verlaat, hoort u in het kort de uitslag van het onderzoek. De consequenties van de uitslag en eventuele behandeling bespreekt u op een later tijdstip met uw behandelend arts.

6.

Wanneer contact opnemen

Neem **DIRECT** contact op met het ziekenhuis als u last krijgt van
- koorts boven 38,5°c,
- helder rood bloedverlies uit de anus dat niet stopt
- acute, ernstige buikpijn.

Op werkdagen tijdens kantooruren (08.30 – 16.00 uur)
Voor patiënten van het **IJsselland Ziekenhuis**
Bel het MDL-centrum: **010 - 258 51 80 / 5181, kies optie 2**

Na 16.00 uur en in het weekend
Centrale Receptie IJsselland Ziekenhuis **010 – 258 50 00**,
vraag naar het avond-/weekend-/nachthoofd.

Verder nog van belang
Deze folder ondersteunt de mondelinge informatie die u van arts of verpleegkundige krijgt. Vraag het hen als u meer wilt weten over onderzoek, operatie, gevolgen, risico's of andere behandelmogelijkheden.
Ontdek Mijn IJsselland De toegang tot uw eigen gegevens, dossier, afspraken en vragenlijsten **mijn-ijsselland**
Aanbevolen websites Betrouwbare medische informatie, aanbevolen door onze zorgverleners **aanbevolen-websites**
IJsselland Folders Al onze patiëntenfolders kunt u opzoeken en lezen in onze Folder Web App **folder app**