Dilatatiebehandeling van de slokdarm

ijsselland ziekenhuis

Hier gaat het om u.

www.ysl.nl

Patiënteninformatie

Op advies van uw behandelend arts ondergaat u binnenkort een dilatatiebehandeling van de slokdarm. Bij deze behandeling wordt een slokdarmvernauwing opgerekt.

Om ervoor te zorgen dat u zo weinig mogelijk hinder van de behandeling ondervindt, krijgt u via een infuusnaaldje in uw hand of arm een pijnstiller én een medicijn dat het bewustzijn verlaagt. U bent **NIET** onder narcose.
Om na te gaan of deze medicatie veilig voor u is, heeft u vooraf een gesprek met een intake verpleegkundige om samen een vragenlijst door te nemen. Deze vragenlijst kan ook digitaal naar u worden toegezonden.

De behandeling wordt verricht door een maag-darm-lever arts. Dit is een ervaren specialist, die daarvoor een specifieke opleiding heeft gehad.

Belangrijk

- Als u **suikerziekte** heeft, moet u dit ruimschoots **vóór** de behandeling kenbaar maken bij de aanvragend arts of de intake-verpleegkundige. We plannen uw afspraak dan bij voorkeur in de ochtend. Let daar zelf ook op als uw afspraak wordt gemaakt!
- Indien u **bloedverdunners** gebruikt dan dient u dit altijd **vóór** de behandeling door te geven aan de aanvragend arts of de intake-verpleegkundige. Ook het gebruik van andere medicatie dient u vooraf met hen te bespreken.
- Indien u bij de **trombosedienst** onder controle bent, dient u hen op de hoogte te stellen van deze behandeling.

Voorbereidingen thuis

Dilatatie behandeling in de **OCHTEND** **(tot 13.00 uur)**	**Dilatatie behandeling in de** **MIDDAG** **(na 13.00 uur)**
De avond vóór de behandeling mag u **Tot 20.00 uur** **normaal eten** **Vanaf 20.00 uur** **niets meer eten** **Vanaf 24.00 uur** - **ook niets meer drinken** - **GEEN medicatie meer innemen (ook niet die u gewend bent in te nemen)** - **GEEN insuline spuiten**	**Tot 06.00 uur** **mag u uw gebruikelijke medicatie innemen** **(indien van toepassing)** **GEEN insuline spuiten** **Tot 08.00** **in de ochtend** mag u nog een beschuitje met beleg naar keuze en een kopje thee **Vanaf 8.00 uur** **niets meer eten en drinken**

Waar meldt u zich op de dag van de behandeling:

Op de afgesproken tijd meldt u zich met uw identiteitsbewijs bij de aanmeldzuil van het **Maag-, Darm- en Levercentrum (MDL-centrum)**, route 99. Nadat u de stappen van aanmelden heeft doorlopen, krijgt u een afspraakticket.

Nadat u zich hier heeft gemeld, kunt u plaatsnemen in de wachtkamer. Daar wordt u door een verpleegkundige opgehaald.


De behandeling

- Wij vragen u plaats te nemen op het onderzoeksbed.
  U mag uw kleding aanhouden.
- U wordt aangesloten op de monitor om u tijdens de behandeling in de gaten te kunnen houden.
- Vervolgens krijgt u een infuusnaaldje in uw arm of hand.
- Wanneer u aan de beurt bent, wordt u met uw bed naar de behandelkamer gereden.
- Wij vragen u dan op uw linkerzij te gaan liggen.
- U krijgt een plastic ring tussen uw tanden om de scoop te beschermen.
- Via het infuusnaaldje krijgt u medicatie toegediend dat het bewustzijn verlaagt, zodat u zo weinig mogelijk hinder van de behandeling ondervindt.
  U bent NIET onder narcose.
- Tijdens de behandeling krijgt u extra zuurstof toegediend.

De endoscoop wordt via uw mond ingebracht. Dit is een lange, dunne, buigzame slang. Hierin zit een andere dunne slang met daaraan een leeg ballonnetje.



Nadat de slang op de juiste plaats is ingebracht, wordt dit ballonnetje van buitenaf met water gevuld. Hierdoor wordt de slokdarmwand opgerekt.



De behandeling duurt in totaal ongeveer 15 minuten.

Na de behandeling

- Na de behandeling wordt u teruggebracht naar de uitslaapkamer van het MDL-centrum.
- Ongeveer een half uur na de behandeling krijgt u iets te drinken en vla te eten.
- Op advies van uw behandelend arts wordt dit uitgebreid naar vast voedsel.

Risico's en complicaties van een dilatatiebehandeling

- Na afloop van de behandeling kunt u last hebben van keelpijn, die meestal binnen 24 uur verdwijnt.
- Van alle mogelijke behandelmethoden brengt het endoscopisch oprekken van de slokdarm het laagste risico met zich mee. In zeldzame gevallen echter ontstaat door het oprekken een gaatje in de slokdarm.

De kans dat deze complicatie optreedt is minder dan 1%. Wanneer dit gebeurt volstaat antibiotica doorgaans, maar in zeldzame gevallen moet het scheurtje via een operatie worden hersteld.

- U kunt wat bloed opgeven na de behandeling. Dit zou slechts eenmalig mogen zijn en in een kleine hoeveelheid.
- Afhankelijk van het soort vernauwing van de slokdarm is het mogelijk dat deze behandeling meerdere keren moet worden herhaald. Zo ook wanneer de slokdarm opnieuw vernauwt. Uw behandelend arts bespreekt dit dan met u.

De uitslag

Voordat u de afdeling verlaat, hoort u in het kort de uitslag van de behandeling. De consequenties van de uitslag en eventuele verdere behandeling bespreekt u op een later moment met uw behandelend arts.

Wanneer neemt u contact op:

Neem **DIRECT** contact op met het ziekenhuis als u last krijgt van

- **(toenemende) pijn in de borstkas/slokdarm.**
- **koorts.**
- **overdadig bloed opgeven.**

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het MDL-centrum
010 – 258 5180 / 5181, kies optie 2.

Na 16.00 uur en in het weekend:
Centrale Receptie IJsselland Ziekenhuis
010 – 258 5000,
vraag naar het avond-/nacht-/weekendhoofd.

Verder nog van belang

Deze folder ondersteunt de mondelinge informatie die u krijgt. Stel vragen als u meer wilt weten over onderzoek, operatie, gevolgen, risico's of andere behandelmogelijkheden.

Ontdek Mijn IJsselland
De toegang tot uw eigen gegevens, dossier, afspraken en vragenlijsten **mijn-ijsselland**

Aanbevolen websites
Betrouwbare medische informatie, aanbevolen door onze zorgverleners **aanbevolen-websites**

IJsselland Folders
Al onze patiëntenfolders kunt u opzoeken en lezen in onze Folder Web App **folder app**