Dummy capsule

Capsule voor onderzoek van de doorgankelijkheid van het maagdarmkanaal

ijssel land ziekenhuis

Samen maken we het verschil.

ysl.nl 010 258 5000

Patiënteninformatie

Waarom dit onderzoek?



Dit onderzoek is een voorbereiding op een ‘camera capsule endocopie’.

De ‘dummy’ capsule is een kleine oplosbare capsule die u inslikt. Met een dummy capsule kunnen we zien of de capsule goed en veilig door uw maag- en darmkanaal passeert en uw lichaam weer met de ontlasting verlaat.
Wanneer dit goed verloopt, is het mogelijk een camera capsule endoscopie te ondergaan.

In deze folder staat de algemene gang van zaken bij het onderzoek,
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u deze voorafgaand aan het onderzoek stellen aan de medewerkers van het Maag-, Darm- en Levercentrum.

Belangrijk!

- Heeft u **slikproblemen**? Wilt u dit melden aan de arts die het dummy-onderzoek heeft aangevraagd.
- U mag de eerste 30 uur na het innemen van de capsule geen **MRI-onderzoek** ondergaan.

Voorbereidingen op de dag van het onderzoek

U mag gewoon eten en drinken.

Waar meldt u zich op de dag van het onderzoek?

Op de afgesproken tijd meldt u zich met uw identiteitsbewijs bij de aanmeldzuil van het **Maag-, Darm- en Levercentrum (MDL-centrum)**, route 99. Wanneer u de stappen van aanmelden heeft doorlopen, krijgt u een QR code. Daarna kunt u

plaatsnemen in de wachtruimte, waar u door één van de assistenten wordt opgehaald.

Het onderzoek

U neemt de dummy capsule in met een glas water.

Na het innemen van de dummy capsule

- Na 24 uur en niet later dan 30 uur na het innemen van de dummy capsule wordt u verwacht op de afdeling Radiologie. Hier wordt een röntgenfoto van de buik gemaakt.
- De MDL arts neemt later contact met u op, om u te laten weten of de dummy capsule het maag- en darmkanaal goed is gepasseerd.
  In dat geval kan de camera capsule endoscopie worden ingepland.
- Let tot 30 uur na inname van de capsule op uw stoelgang: verloopt die normaal?

Mogelijke complicaties

Als de capsule in uw darmen blijft hangen, kan het betekenen dat er een vernauwing in het maagdarmkanaal zit. Meestal lost de dummy capsule dan binnen 35 uur vanzelf op.
In zeldzame gevallen is dat niet zo. Dan kan een chirurgische ingreep noodzakelijk zijn.

Wanneer contact opnemen?

Neem ***direct*** contact op met het ziekenhuis als u last krijgt van **pijn** en/of **een opgezette buik**, **misselijkheid of braken**!

Heeft u nog vragen?

Dan kunt u contact opnemen met het MDL-centrum op werkdagen tussen 08.30 en 16.00 uur.
Telefoonnummer 010 – 258 51 80 / -5181, kies optie 2.

Buiten deze tijden kunt u bellen met 010 – 258 5000 en vragen naar het avond-/nachthoofd.

Verder nog van belang
Deze folder ondersteunt de mondelinge informatie die u krijgt. Stel vragen als u meer wilt weten over onderzoek, operatie, gevolgen, risico's of andere behandelmogelijkheden.
Ontdek Mijn IJsselland De toegang tot uw eigen gegevens, dossier, afspraken en vragenlijsten **mijn-ijsselland**
Persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) Website/app (gratis) waarop u al uw gezondheidsgegevens kunt bundelen en raadplegen **PGO**
IJsselland Folders Al onze patiëntenfolders kunt u opzoeken en lezen in onze Folder Web App **folder app**

ijssel land ziekenhuis

MDL.009 / 290526.AA