Plassen in een plaszak na uw onderzoek

Tijdens uw onderzoek krijgt u een contrastmiddel via een bloedvat toegediend. Dit verlaat uw lichaam via de urine. Het is moeilijk om contrastmiddel uit het rioolwater te zuiveren, waardoor het in het grond- en uiteindelijk in het drinkwater kan terechtkomen. Daarom vragen we u om de eerste vier keer na de CT-scan/MRI in een plaszak te plassen.

Hoe werkt het?
Na uw onderzoek krijgt u vier plaszakken mee. De eerste vier keer dat u moet plassen, gebruikt u deze in plaats van de toiletpot. U kunt de gebruikte plaszak bij het gewone restafval weggooien.
Gooi de plaszak dus *niet* in de toiletpot.

Dit lijkt misschien wat ongemakkelijk, maar plassen in de plaszak is net zo eenvoudig en hygiënisch als op het toilet. De zak bevat korrels die de urine omzetten in gel, waardoor morsen wordt voorkomen.



Gebruiksaanwijzing

De plaszak kan zowel zittend als staand worden gebruikt.
Uw plas wordt direct, door een middel in de plaszak, omgezet in gel.

Als u klaar bent, sluit u de plaszak.

Gooi de afgesloten plaszak daarna bij het restafval in de afvalbak.

Gebruik elke plaszak dus maar één keer.



1. Gebruik plaszak **2.** Sluit de plaszak **3.** Afvalbak



Gebruiksaanwijzing voor vrouwen

Plaats de geopende witte opening van de plaszak tegen uw onderlijf met de verhoogde rand van de plaszak naar u toe (zie plaatje).



Gebruiksaanwijzing voor mannen

Plaats de geopende witte opening van de plaszak met de verhoogde rand van de plaszak van u af (zie plaatje).

Meer informatie
Heeft u nog vragen?
Kijk dan op www.plaszakziekenhuis.nl.

ijsselland ziekenhuis