Hysterosalpingografie (HSG)

Röntgenonderzoek van baarmoeder en eileiders

ijsselland ziekenhuis

Hier gaat het om u.

www.ysl.nl

Patiënteninformatie

Inleiding

In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten tot een röntgenonderzoek van de baarmoeder en eileiders (hysterosalpingografie).
Hystero-salpingo-grafie betekent: het zichtbaar maken van de baarmoederholte en eileiders door middel van een röntgenfoto met behulp van een jodiumhoudende contrastvloeistof.

Doel van het onderzoek

- Bij een **zwangerschapswens** is het doel van het onderzoek
  - het beoordelen of er afwijkingen in de baarmoederholte zijn,
  - of de eileiders doorgankelijk zijn en
  - het verhogen van de kans op zwangerschap de eerste zes maanden na het onderzoek.
- Bij controle na een sterilisatie, wordt dit onderzoek gedaan om te zien of de eileiders inderdaad ondoorgankelijk zijn geworden.
- Ook bij verdenking op een **vormafwijking** van de baarmoeder kan een HSG worden gepland.

Afspraak maken

Bij voorkeur wordt de afspraak gepland in de eerste helft van de cyclus (voor cyclusdag 12).
U kunt dit onderzoek afspreken door op de 1e of 2e dag van de menstruatie te bellen naar de polikliniek Gynaecologie.

Mocht u op het afgesproken tijdstip verhinderd zijn, bel dan zo spoedig mogelijk de polikliniek Gynaecologie, telefoonnummer **010 – 258 5920**.

Waar meldt u zich op de dag van uw onderzoek

U meldt zich met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil in onze centrale hal. Nadat u de stappen van aanmelden heeft doorlopen, krijgt u een afspraakticket met een QR code en het routenummer waar u moet zijn. Scan daar de QR code bij de zuil. Dan weten wij dat u bent gearriveerd.

Voorbereiding thuis

Het onderzoek kan krampen in de baarmoeder of pijn in de onderbuik of onderrug geven. Wij adviseren daarom om ongeveer een uur voor het onderzoek een pijnstiller te nemen, zoals 2 tabletten Naproxen (op recept) of paracetamol (*lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing in de verpakking*). Neem ook iemand mee, die u na het onderzoek naar huis kan brengen.

Jodiumallergie

In de contrastvloeistof die tijdens het onderzoek wordt gebruikt, zit jodium. Als u hier overgevoelig voor bent (jodiumallergie), meld dit dan aan uw arts. Er wordt dan voor een ander onderzoek gekozen.


Antibiotica

Soms krijgt u van de behandelend arts antibiotica voorgeschreven. Deze neemt u de dag vóór het onderzoek in (bijvoorbeeld in geval er antistoffen tegen chlamydia zijn gevonden).

Het onderzoek

Uw partner of een vriend(in) mag bij het onderzoek aanwezig zijn. Nadat de gynaecoloog heeft uitgelegd wat hij/zij gaat doen, kunt u in de onderzoekkamer plaatsnemen op de röntgentafel.
De gynaecoloog brengt een speculum (eendenbek) in en brengt dan via de baarmoedermond een dunne katheter in de baarmoeder in. Hierdoor kan een kleine hoeveelheid contrastmiddel in de baarmoeder worden ingebracht.

Bij zwangerschapswens



Vaak worden 2 of 3 foto's gemaakt, bijvoorbeeld één foto na vulling van de baarmoederholte en eileiders en een tweede foto nadat het contrast via de eileiders in de buikholte is gekomen.
Om de verspreiding van de contrastvloeistof goed te kunnen beoordelen, is het soms nodig een zogenaamde restfoto te maken (10-30 minuten na het onderzoek).

Uitslag en controle

Tijdens het onderzoek hoort u al een voorlopige uitslag van de gynaecoloog. Bij de eerstvolgende poliklinische controle (of telefonische afspraak) bespreekt uw vaste gynaecoloog de definitieve uitslag en het verdere beleid met u.

Na het onderzoek

Direct na het onderzoek kunt u naar huis. Na het onderzoek kunt u gedurende 2 à 3 dagen een gevoelige onderbuik of wat bloedverlies of bruinige afscheiding hebben. Deze verschijnselen gaan in principe vanzelf over.

Neem contact op met de polikliniek Gynaecologie bij aanhoudende klachten of koorts. Er kan dan sprake zijn van een infectie. Er bestaat geen bezwaar tegen geslachtsgemeenschap en zwangerschap na het onderzoek.

Complicaties

Bij een klein aantal vrouwen treedt na het onderzoek een infectie op, doordat bacteriën vanuit de vagina of baarmoedermond richting eileider kunnen worden verplaatst.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met de medewerkers van de polikliniek gynaecologie, telefoonnummer **010 – 258 5920.**

Verder nog van belang
Deze folder ondersteunt de mondelinge informatie die u krijgt. Stel vragen als u meer wilt weten over onderzoek, operatie, gevolgen, risico's of andere behandelmogelijkheden.
Ontdek Mijn IJsselland De toegang tot uw eigen gegevens, dossier, afspraken en vragenlijsten **mijn-ijsselland** Bekijk onze korte animatie **Bekijk uw gegevens in Mijn IJsselland**