

Implantaat plaatsen

 **ijssel land**
ziekenhuis

Hier gaat het om u.

www.ysl.nl

Patiënteninformatie

U heeft een afspraak met de kaakchirurg voor het plaatsen van één of meerdere implantaten. De kaakchirurg heeft met u besproken waarom deze behandeling wordt uitgevoerd. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Dan kunt u die stellen aan de kaakchirurg.

Wat is een tandheelkundig implantaat

Een implantaat is een klein en zeer sterk element van metaal of keramiek. Het wordt geplaatst op de plek van de ontbrekende tandwortel ter ondersteuning van de kroon. Deze behandeling is wetenschappelijk getest en wordt al meer dan 30 jaar wereldwijd gebruikt door gekwalificeerde tandartsen en kaakchirurgen.

De kaakchirurg beslist samen met u hoeveel implantaten worden geplaatst.

- ✓ U krijgt een offerte met de geschatte kosten voor het plaatsen van het implantaat.
- ✓ De offerte voor het plaatsen van de kroon op het implantaat krijgt u van de tandarts.

Hoe groot is de kans van slagen

Zeer groot. Goed onderzoek vooraf maakt de kans op complicaties of mislukkingen minimaal. Toch kan er tijdelijk ongemak zijn in de vorm van napijn of zwelling. Ook komt het een enkele keer voor dat een implantaat niet integreert en moet worden verwijderd. De kans hierop is groter als u rookt.



De eerste twee weken kunt u het beste zachte voeding eten. Eet liever geen hard voedsel, zoals stokbrood, appels of pinda's. Het implantaat kan dan goed vastgroeien. U hoeft geen maaltijd over te slaan en u kunt de normale hoeveelheden aanhouden. Eten en drinken kan het beste lauw van temperatuur zijn: niet te heet - niet te koud.

De behandeling

De implantaten worden onder plaatselijke verdoving geplaatst.

De behandeling kunt u wellicht als oncomfortabel ervaren maar is niet pijnlijk. De wond wordt gehecht met een hechtdraad die vanzelf oplost. Dat kan wel 2 weken duren.

1. Bij toepassing van een éénfase-implantaat is het implantaat al direct zichtbaar ná de behandeling.
2. Bij een tweefasen-implantaat wordt het tandvlees over de wond gehecht. Er volgt altijd een tweede, kleinere ingreep onder plaatselijke verdoving. Nadat een kleine opening in het tandvlees is gemaakt, worden opzetstukjes aangebracht op de implantaten.

Deze opzetstukjes (healing caps) zijn hierna zichtbaar in uw mond.

Is het implantaat vastgegroeid in uw kaakbot en is de genezing van het omliggende tandvlees goed verlopen? Dan kunt u een afspraak maken met uw tandarts. **Uw tandarts zal de kroon plaatsen.**

Na de behandeling

De klachten kunnen bestaan uit een pijnlijk wondgebied in de mond of enige zwelling met eventueel een bloeditstorting. Soms verandert het gevoel in de onderlip. De klachten zijn meestal beperkt en kunnen in duur variëren van enkele dagen tot een week. U kunt na de ingreep de voorgeschreven pijnstillers gebruiken.

Poetsen

Start met het poetsen op de plek van het implantaat na vier tot vijf dagen. Zo zorgt u ervoor dat u het dopje van het implantaat schoonhoudt. Gebruik een zachte tandenborstel zonder tandpasta en poets voorzichtig, zodat het hechtdraad niet losgaat. De hechtingen lossen na 10-14 dagen vanzelf op. Poets na iedere maaltijd en voor het slapen gaan. De eerste 12 weken niet elektrisch poetsen.

Opzetstukje

Het implantaat wordt met een opzetstukje afgesloten. Dit kan los gaan zitten. Dit kunt u bij de kaakchirurg weer vast laten zetten. Wacht niet te lang, anders kan het tandvlees over het implantaat heen groeien.

Geïrriteerd tandvlees

Als uw tandvlees bij het poetsen gaat bloeden, dan is het waarschijnlijk geïrriteerd. Om te voorkomen dat het gaat bloeden, poetst u voorzichtig het geïrriteerde gebied. Ook als het wel bloedt, poetst u goed en zorgvuldig. Als u uw gebit en tandvlees goed schoonhoudt, verdwijnt de irritatie. Als u Perio-Aid in huis heeft, kunt u dit 2x daags gebruiken gedurende 2 weken. Een geopende fles is 12 maanden houdbaar. Goed uitspugen en niet naspoelen met water.

Zwelling

Na de behandeling kunt u zwelling verwachten. Dit kunt u beperken door het wondgebied te koelen met een koelelement of ijsklontjes in een washandje. Wissel steeds af: 15 minuten koeling, 15 minuten zonder koeling. Soms ontstaat een bloeditstorting die langzaam weer verdwijnt en in zeldzame gevallen kan afzakken tot op uw borst.

Pijn

De plaatselijke verdoving is na enkele uren uitgewerkt. Daarna kunt u pijn krijgen. Neem zo nodig een pijnstiller die u heeft voorgeschreven gekregen en/of paracetamol 1000 mg.

Spoelen

De eerste 24 uur na de ingreep NIET krachtig spoelen. Dit kan tot een nabloeding leiden. Hierna kunt u de voorgeschreven mondspoeling gebruiken.

Roken en alcohol

Het advies is een week na de behandeling niet te roken en geen alcohol te gebruiken. Dit vertraagt het genezingsproces van uw wond.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met de polikliniek Mond-, Kaak en Aangezichtschirurgie (MKA), telefoonnummer **010 – 258 59 45**.

Verder nog van belang

Deze folder ondersteunt de mondelinge informatie die u van arts of verpleegkundige krijgt.

Ontdek Mijn IJsselland

De toegang tot uw eigen gegevens, dossier, afspraken en vragenlijsten [mijn-ijsselland](https://mijn-ijsselland.nl)