Informatie na trekken van tanden en kiezen en plaatsen kunstgebit

Totale extractie boven- en/of onderkaak met plaatsen prothese

ijsselland ziekenhuis

Hier gaat het om u.

www.ysl.nl

Patiënteninformatie

U bent behandeld door de kaakchirurg. Om een spoedig herstel te bevorderen, is het in uw eigen belang dat u de navolgende informatie goed doorleest en de adviezen nauwkeurig opvolgt. Uiteraard hoeven de beschreven klachten niet allemaal bij u voor te komen.

Afspraak maken

Wij adviseren u om een afspraak te maken voor ongeveer 24 uur na de ingreep bij degene die uw prothese heeft gemaakt om deze eventueel aan te passen. Er kunnen namelijk pijnlijke drukpunten in de prothese zijn. Door de prothese aan te passen kunnen deze drukpunten worden opgeheven.

Eten en drinken

De eerste 24 uur na de ingreep mag u geen zeer warme, zeer koude of alcoholhoudende dranken gebruiken.
De eerste dagen na de ingreep kunt u beter geen (erg) hard voedsel gebruiken. Dit alles om de wond te ontzien.
Probeer de eerste dagen niet te roken - roken verhoogt de kans op ontstekingen!

Mondhygiëne de eerste 24 uur

Na het trekken van de tanden en kiezen wordt de prothese meteen geplaatst.

- U moet de prothese de eerste 24 uur in uw mond houden omdat deze anders vanwege de zwelling niet meer past.
- Na 24 uur spoelt u de prothese af onder de kraan en plaatst u die meteen weer in uw mond.

Mondhygiëne na 24 uur

- Het is belangrijk dat u de prothese met regelmaat schoonmaakt: minimaal 2x per dag.
- ’s Nachts doet u de prothese uit en legt deze in een bakje met water waar een speciaal middel aan is toegevoegd om de prothese schoon te houden (bijvoorbeeld Steradent tabletten).
- Ook is het belangrijk om, ondanks dat u geen eigen tanden meer heeft, wel regelmatig uw mond na te laten kijken door een tandarts of tandtechnicus.

Napijn

Na de behandeling is het normaal dat u pijn krijgt.
U kunt de pijn bestrijden met paracetamol. Dit kunt u kopen bij drogist en apotheek. Zo nodig schrijft de kaakchirurg een andere pijnstiller voor.
De plaatselijke verdoving is na 2 tot 4 uur uitgewerkt.

U kunt het beste met de pijnstillers beginnen vóórdat de plaatselijke verdoving volledig is uitgewerkt.

Andere verschijnselen

Een dikke wang, een blauwgele verkleuring en een verminderde mondopening zijn normaal. De zwelling neemt na 3 tot 5 dagen weer af. Als dat niet het geval is of als u zich zorgen maakt over andere verschijnselen, neem dan contact op met de polikliniek kaakchirurgie.

Koorts

Koorts is gedurende de eerste dagen normaal. Krijgt u plotseling koorts boven 39°C of blijft de koorts langer dan vijf dagen aanhouden, neem dan contact op met de polikliniek kaakchirurgie.
Heeft u een hartprobleem (hartruis, hartklepprothese) en krijgt u koorts boven 39°C, neem dan direct contact op met uw behandelend cardioloog!

Nabloeding

Gedurende de eerste dagen kunnen bloedstolsels het speeksel rood kleuren, waardoor de indruk kan ontstaan dat er sprake is van een nabloeding.
Dit is echter zelden het geval. Bij een nabloeding is er meer bloed dan speeksel in de mond.
In dat geval moet u gedurende een half uur stevig bijten (dichtbijten) op een dubbel gevouwen verbandgaas of zakdoek.
Bloedt de wond aan de zijkant dan kunt u daar een gaasje of zakdoek aanbrengen en dit met uw duim gedurende een half uur aandrukken.
Gebruik **geen watten** en kijk niet tussendoor of het bloeden al gestopt is.
Stopt het bloeden hierna niet, herhaal dan deze procedure.
Helpt dit nog niet, neem dan contact op met de polikliniek kaakchirurgie.

Hechtingen

Mocht het nodig zijn, dan worden er oplosbare hechtingen gebruikt die na ongeveer 14 dagen vanzelf oplossen.

Open verbinding naar de kaakholte

Soms steken de wortels van de bovenkiezen uit de kaakholte.
Als deze kiezen worden verwijderd, kan een open verbinding tussen mond en kaakholte ontstaan. Door deze opening kan speeksel in de neusbijholte komen waardoor een ontsteking kan ontstaan.
Daarom moet zo'n verbinding nauwkeurig met hechtingen worden gesloten.

Het is heel belangrijk dat u daarna gedurende 2 weken drukverschillen tussen de neus en de mond vermijdt om te voorkomen dat de verbinding weer opengaat. Dus niet hard blazen, zuigen of snuiten. Moet u niezen, houdt de mond dan open. De eerste twee dagen kan er nog wat bloed uit de neus komen. Dat is normaal en stopt vanzelf.

Verdoving

Als kiezen in de onderkaak zijn behandeld, kan het een enkele keer voorkomen dat, nadat de verdoving is uitgewerkt, het verdoofde gevoel in de onderlip blijft.
Het normale gevoel zal in het algemeen na 2 tot 8 weken vanzelf weer terugkeren. Als dit niet het geval is, neem dan contact op met de polikliniek kaakchirurgie.

De verdoving beïnvloedt de rijvaardigheid niet. U kunt na de ingreep zelf naar huis, begeleiding is in principe niet nodig.
U kunt natuurlijk altijd vragen of iemand u begeleidt naar huis, als u dat prettig vindt.

Wanneer contact opnemen

- Als -na minimaal 3 dagen- de zwelling **erger wordt** en **niet minder**.
- Als u koorts krijgt, 38,5˚C of meer.
- Bij slikklachten.
- Als uw wang rood en glimmend wordt.
- Als u zich erg ziek gaat voelen.

Bel dan op werkdagen tijdens kantooruren met de medewerkers van polikliniek Mond-, Kaak en Aangezichtschirurgie (MKA) op telefoonnummer **010 – 258 5945**.
Bel ’s avonds en in het weekend naar het algemene nummer van ons ziekenhuis: 010 – 258 5000.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met de medewerkers van polikliniek Mond-, Kaak en Aangezichtschirurgie (MKA).