

Injectie met medicatie met behulp van echo

(Lidocaïne en Kenacort)

 **ijsselland**
ziekenhuis

Hier gaat het om u.

www.ysl.nl

Patiënteninformatie

Binnenkort ondergaat u een behandeling met een injectie met medicatie op de afdeling Radiologie. In deze folder leest u wat de behandeling inhoudt en aan welke voorschriften u zich moet houden om een zo goed mogelijk resultaat te bereiken. Wij adviseren u deze folder zorgvuldig door te nemen.

Wat houdt de behandeling “injectie met medicatie” in

Bij diverse aandoeningen van het steun- en bewegingsapparaat kan het zinvol zijn een injectie met Lidocaïne en Kenacort te geven.

- Lidocaïne is een verdovingsmiddel met een pijnstillende werking.
- Kenacort is een corticosteroid met een ontstekingsremmende werking.

De injectie onderdrukt de ontstekingsreactie in de weefsels en vermindert zo de pijn en de zwelling.

Het ontstekingsremmende effect kan na 2 á 3 dagen beginnen, maar soms ook pas na enkele weken. De duur van het effect varieert van enkele weken tot lange tijd.

Lidocaïne (verdooving) werkt meestal gelijk en houdt 2 tot 3 uur aan.

BELANGRIJK

Bent u overgevoelig voor Lidocaïne of Kenacort en is die NIET met uw arts besproken, neem dan direct contact op met de afdeling Radiologie.

Voorbereidingen

U hoeft voor deze behandeling geen voorbereidingen te treffen.

Waar meldt u zich op de dag van uw behandeling

U meldt zich met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil in onze centrale hal. Nadat u de stappen van aanmelden heeft doorlopen, krijgt u een afspraakticket met een QR code en het routenummer waar u moet zijn. Scan daar de QR code bij de zuil. Dan weten wij dat u bent gearriveerd.



De behandeling

Wanneer uw naam wordt afgeroepen, gaat u met de laborant(e) mee naar de kleedkamer. De laborant(e) vraagt u het te behandelen lichaamsdeel te ontkleden.

De radioloog of laborant(e) bepaalt met behulp van een echoapparaat de plaats van de injectie. Dan wordt de plaats aangeprikt met een naald. Dit prikken kan gevoelig zijn. Op het prikgaatje wordt een pleister geplakt en de behandeling is klaar.

De behandeling duurt ongeveer 10 tot 20 minuten.

Na de behandeling

Wij adviseren u

- het betreffende gewricht de komende 24 uur te ontlasten. Een normale, niet intensieve belasting kan geen kwaad.
- niet zelfstandig deel te nemen aan het verkeer na de injectie. Reden: verzekeringsmaatschappijen keren niet uit bij een ongeval kort nadat een verdoving en/of medicijn in een gewricht is gebracht.

Tot slot

Wij doen ons best om u op de afgesproken tijd te helpen. Wilt u er voor zorgen dat u op tijd aanwezig bent voor de behandeling?

Indien u verhinderd bent, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk laten weten? De open gevallen plaats kan dan door een andere patiënt worden ingevuld.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met de afdeling Radiologie, telefoonnummer **010 – 258 5975**.

Verder nog van belang

Deze folder ondersteunt de mondelinge informatie die u krijgt. Stel vragen als u meer wilt weten over onderzoek, operatie, gevolgen, risico's of andere behandelmogelijkheden.

Ontdek Mijn IJsselland

De toegang tot uw eigen gegevens, dossier, afspraken en vragenlijsten [mijn-ijsselland](#)

Bekijk onze korte animatie [Bekijk uw gegevens in Mijn IJsselland](#)

Persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO)

Website/app (gratis) waarop u al uw gezondheidsgegevens kunt bundelen en raadplegen [PGO](#)

Aanbevolen websites

Betrouwbare medische informatie, aanbevolen door onze zorgverleners [aanbevolen-websites](#)

IJsselland Folders

Al onze patiëntenfolders kunt u opzoeken en lezen in onze Folder Web App [folder app](#)