Leverbiopsie

onder echogeleide

ijsselland ziekenhuis

Hier gaat het om u.

www.ysl.nl

Patiënteninformatie

Waarom een leverbiopsie

Om de precieze aard van een leverafwijking vast te stellen, is het soms nodig een stukje weefsel (een biopt) uit de lever weg te halen. In deze folder beschrijven wij dit onderzoek.

Bent u zwanger?

Ook dan kan een leverbiopsie plaatsvinden maar we doen dit alleen indien het echt nodig is.

Enkele dagen vóór het onderzoek moet u stoppen met het slikken van bepaalde medicijnen. De arts die de medicatie heeft voorgeschreven of de arts die het onderzoek aanvraagt, bespreekt dit met u. Het is belangrijk dat u deze adviezen opvolgt!

Als u doorgaat met het slikken van één van deze medicijnen, meld dit dan aan de behandelend arts die het onderzoek afspreekt én de arts die het onderzoek uitvoert.

Voorbereidingen

- Voor de behandeling moet u **nuchter** zijn. U mag daarom vanaf middernacht (00.00 uur) vóór het onderzoek **niet** meer eten of drinken.
- Heeft u suikerziekte of gebruikt u medicijnen die u ’s morgens moet innemen? Overleg dit dan vooraf met uw behandelend arts.
- Indien nodig krijgt u een labformulier mee op de polikliniek om een uur vóór het onderzoek bloed te laten prikken. Dit om te kijken of uw bloed snel genoeg stolt.
- Wij adviseren u iemand te vragen om u na het onderzoek op te komen halen.

Waar meldt u zich op de dag van uw onderzoek

Is met u afgesproken dat eerst bloed moet worden geprikt?
Meldt u zich dan eerst bij balie Bloedafname. Lever daar het aanvraagformulier in dat u op de polikliniek heeft ontvangen of aan u is toegestuurd.

- Weet u al waar u moet zijn?
  Dan mag u meteen (*of na het bloedprikken*) doorlopen naar de betreffende afdeling.
- Weet u niet waar u moet zijn?
  Meldt u zich dan bij de receptiebalie in de hal.


Tip
Log thuis even in op 'Mijn IJsselland' (via onze website www.ysl.nl). Als u dat doet de avond voor u wordt opgenomen, dan ziet u daar staan wáár we u verwachten.

Leverbiopsie onder echo geleide

- De verpleegkundige op de afdeling neemt een aantal gegevens met u door en meet uw bloeddruk en pols.
- Daarna wordt u naar de afdeling radiologie gebracht voor het nemen van het leverbiopt.
- Onder geleide van een echoapparaat wordt een biopt genomen door de radioloog.
- Na afloop wordt u weer naar de verpleegafdeling gebracht.

Het onderzoek

- De radioloog vraagt u op uw rug te gaan liggen met de rechterarm achter uw hoofd. Met behulp van een echoapparaat bepaalt hij de plek waar de leverbiopsie kan worden uitgevoerd.
- De prikplaats wordt gemarkeerd en gedesinfecteerd met alcohol.



- Daarna wordt de prikplaats met lidocaïne verdoofd. Deze prikjes kunnen wat vervelend en soms koud of branderig aanvoelen.
- Als de verdoving werkt, maakt de radioloog een sneetje van enkele millimeters. U voelt hier niets van. Daarna neemt hij met een speciale biopsienaald een stukje leverweefsel weg. Om voldoende weefsel te verkrijgen voor het stellen van een diagnose, worden soms via het insteekgaatje meerdere biopten verricht. De biopten (stukjes leverweefsel) worden op het laboratorium microscopisch onderzocht.
- Tijdens de biopsie geeft de radioloog aanwijzingen over uw ademhaling. Soms moet u inademen, soms juist weer uitademen. Dit is afhankelijk van de plek waar het om gaat.
- Na het onderzoek wordt het wondje schoongemaakt en we doen er een pleister op.
- **Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.**

Na het onderzoek

- Na het onderzoek wordt u naar de verpleegafdeling terug gebracht. Daar blijft u minimaal 4 uur.
- Tot 2 uur na het onderzoek moet u plat op uw rechterzij blijven liggen. Dit om nabloeden te voorkomen.
- Daarna houdt u in ieder geval de eerste 2 tot 4 uur bedrust.
- De punctieplaats en uw bloeddruk worden meerdere malen gecontroleerd.
- Tot 2 uur na het onderzoek moet u nuchter blijven.
- Het leverbiopt vind plaats in dagopname, tenzij uw behandelend arts het noodzakelijk vindt dat u een nacht moet blijven.
- Wij adviseren u iemand te vragen om u op te komen halen.
- Na één dag kunt u weer werken en sporten.

Mogelijke complicaties

- De lever is een rijk doorbloed orgaan. Hierdoor bestaat de kans dat door de biopsie een bloeding optreedt. Om dit in de gaten te kunnen houden is een dagopname nodig.
- Kort na de ingreep kunt u pijn in uw schouder ervaren. Dit is een normaal verschijnsel.
- Op de plaats van de biopsie kan de buikwand nog enkele dagen gevoelig zijn. Gebruik eventueel paracetamol tegen de pijn *(lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing in de verpakking)*.

De uitslag

De uitslag van het onderzoek is na 7 -10 dagen bekend.
Uw behandelend arts stelt u zo spoedig mogelijk op de hoogte van de resultaten van het onderzoek. Meestal is dit tijdens de volgende afspraak op de polikliniek.

Wanneer contact opnemen?

Neem **DIRECT** contact op met het ziekenhuis als u last krijgt van
- koorts, hoger dan 38,5 °C.
- aanhoudende, heftige pijn in de rechter bovenbuik.

Bel polikliniek Interne Geneeskunde: **010 - 258 5930.**

Na 16.00 uur en in het weekend
Centrale Receptie IJsselland Ziekenhuis
010 – 258 5000, vraag naar het avond-/nacht-/weekendhoofd.

Als u vragen heeft, kunt u natuurlijk ook contact met ons opnemen via bovenstaand telefoonnummer.

Verder nog van belang

Deze folder ondersteunt de mondelinge informatie die u krijgt. Stel vragen als u meer wilt weten over onderzoek, operatie, gevolgen, risico's of andere behandelmogelijkheden.

Ontdek Mijn IJsselland
De toegang tot uw eigen gegevens, dossier, afspraken en vragenlijsten **mijn-ijsselland**
Bekijk onze korte animatie **Bekijk uw gegevens in Mijn IJsselland**

Persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO)
Website/app (gratis) waarop u al uw gezondheidsgegevens kunt bundelen en raadplegen **PGO**

Aanbevolen websites
Betrouwbare medische informatie, aanbevolen door onze zorgverleners **aanbevolen-websites**

IJsselland Folders
Al onze patiëntenfolders kunt u opzoeken en lezen in onze Folder Web App **folder app**