

U krijgt een longfunctieonderzoek HISTAMINE PROVOCATIETEST.

Voor dit onderzoek STOPT u met de volgende medicatie:

Datum onderzoek:

Tijd:

kortwerkende longmedicatie, stoppen 8 uur voor aanvang onderzoek:

Atrovent	(Ipratropiumbromide)
Airomir	(Salbutamol)
Berodual	(Ipratropiumbromide/ Fenoterolhydrobromide)
Ventolin	(Salbutamol)
Bricanyl	(Terbutaline)
Combivent	(Salbutamol/ Ipratropium)
Ipratropiumbromide	
Salbutamol	
Terbutaline	
Berotec	(Fenoterol)
Tilade	(Nedocromil)

kortwerkende longmedicatie, stoppen 12 uur voor aanvang onderzoek:

Atimos	(Formoterol)
Duaklir	(Aclidinium/ Formoterol)
Eklira	(Aclidinium)
Formoterol	
Oxis	(Formoterol)
Salmeterol	
Serevent	(Salmeterol)
Foradil	(Formoterol)

langwerkende longmedicatie, stoppen 24 uur voor aanvang onderzoek:

Anoro	(Umeclidinium/Vilanterol)
Bevespi	(Formoterol/ Glycopyrronium)
Incruse	(Umeclidinium)
Onbrez	(Indacaterol)
Seebri	(Glycopyrronium)
Spiolto	(Tiotropium/ Olodaterol)
Spiriva	(Tiotropium)
Striverdi	(Olodaterol)
Tiotropium	
Tiotrus	(Tiotropium)
Xoterna	(Indacaterol/ Glycopyrronium)
Ultibro	(Indacaterol/ Glycopyrronium)

overige langwerkende longmedicatie, stoppen 48 uur voor aanvang onderzoek:

Theolair/ Unilair	(Theofylline)
Daxas	(Roflumilast)

longmedicatie, stoppen 4 dagen voor aanvang onderzoek:

Airflusal Forspiro	(Salmeterol/ Fluticason)
Aerivo	(Salmeterol/ Fluticason)
Alvesco	(Ciclesonide)
Bufoier	(Formoterol/ Budesonide)
Busalair	(Budesonide/ Salmeterol)
Elpenhaler	(Salmeterol/ Fluticason)
Flixotide	(Fluticason)
Fluticason	
Flutiform	(Formoterol/ Fluticason)
Foster	(Formoterol/ Beclometason)
Lomudal	
Pulmicort	(Budesonide)
Qvar	(Beclomethason)
Relvar	(Vilanterol/ Fluticason)
Seretide	(Salmeterol/ Fluticason)
Spiromax douresp.	(Formoterol/ Budesonide)
Symbicort	(Formoterol/ Budesonide)
Trelegy	(Fluticason/ Umeclidinium/ Vilanterol)
Trimbow	(Formoterol/ Beclometason/ Glycopyrronium)
Vincion	(Salmeterol/ Fluticason)

Opmerking:

Soms kan de arts besluiten de eerste keer dat een patiënt voor dit onderzoek komt, om **alle** inhalatiemedicatie te stoppen.

Vanaf 4 dagen voor de test, stopt u ook met:

Aerius	Fluticason, Flixotide	Promethazine	Triludan
Allerfre	Kestin	Rupatidine	Xyzal
Alvesco	Levocetirizine	Semprex	Zaditen
Cetirizine	Mizollen	Singulair	Zyrtec
Claritine	Montelukast	STP-free	
Clemastine	Polarimine	Tavergyl	
Desloratadine	Prednison/ Prednisolon	Telfast	
Fexofenadine	Prevalin allerstop tabletten	Tinset	