Lumbaalppunctie



In de digitale folder vindt u een link naar een korte animatie

ijsselland ziekenhuis

Samen maken we het verschil.

ysl.nl 010 258 5000

Patiënteninformatie

Algemeen

Een lumbaalpunctie is een onderzoek waarbij met een holle naald onder uit de rug vocht wordt afgenomen.
Een lumbaalpunctie wordt ook wel een "ruggenprik" genoemd.

Bekijk de animatie, klik op de knop of de link:

Diagnostische lumbaalpunctie



Contra-indicaties

- Het onderzoek kan niet gebeuren indien er sprake is van een zogenaamde bloedziekte met vertraagde bloedstolling.
- Ook wanneer u sterke bloedverdunners gebruikt, zoals Sintrom, Acenocoumarol, Marcoumar, Fenprocoumon, Dabigatran, Rivaroxaban en Apixaban kan het onderzoek niet plaatsvinden. U dient dan vooraf met uw behandelend arts te overleggen.
- Aspirine, Ascal en Acetosal kunt u door blijven gebruiken.
- Wanneer u Clopidogrel, Asasantin of Persantin gebruikt, dient u 5 dagen vóór het onderzoek met deze medicatie te stoppen.

Het onderzoek

Op de dag van het onderzoek meldt u zich bij de afdeling Dagverpleging (B1).
U kunt meteen doorlopen naar de afdeling, u hoeft zich niet aan te melden bij één van de aanmeldzuilen in de hal.

Tijdens de punctie zult u stil moeten liggen. Er wordt geen verdoving toegediend omdat de prik om te verdoven hetzelf-de aanvoelt als de eigenlijke prik!

Soms gebeurt het onderzoek zittend.

Het onderzoek is niet helemaal pijnvrij en soms kan tijdens de prik de naald langs een zenuw schuren. Dit kan kortdurende pijnklachten in het been geven.
Het is onmogelijk om zenuwen door te prikken of in het ruggenmerg zelf te prikken.

Het onderzoek duurt enkele minuten.

De nabehandeling

Na het onderzoek moet u gedurende 1 uur plat in bed blijven liggen. Het volgende uur mag u weer uit bed en naar het toilet. Het is verstandig om na het onderzoek veel te drinken. Over het algemeen wordt u op de dag van het onderzoek uit het ziekenhuis ontslagen.

Complicaties

Soms (bij minder dan 5% van de patiënten) treedt hoofdpijn op na de punctie. Dit gebeurt wanneer het prikgaatje nog even lekt. De druk op het gaatje neemt af wanneer u gaat liggen en het gaatje zal sneller dicht gaan.
De hoofdpijn trekt dan meestal snel weg. Wij adviseren u in dat geval 24 uur platte bedrust te houden.
In enkele gevallen kan de hoofdpijn enkele dagen aanhouden.

Heeft u nog vragen?

Deze kunt u stellen aan uw behandelend specialist.
Ook kunt u telefonisch contact opnemen met de polikliniek neurologie: tel. **010 – 258 5950.**

Verder nog van belang

Deze folder ondersteunt de mondelinge informatie die u van arts of verpleegkundige krijgt. Vraag het hen als u meer wilt weten over onderzoek, operatie, gevolgen, risico's of andere behandelmogelijkheden.

Ontdek Mijn IJsselland

De toegang tot uw eigen gegevens, dossier, afspraken en vragenlijsten **mijn-ijsselland**

Aanbevolen websites

Betrouwbare medische informatie, aanbevolen door onze zorgverleners **aanbevolen-websites**

IJsselland Folders

Al onze patiëntfolders kunt u opzoeken en lezen in onze Folder Web App **folder app**

ijssel land ziekenhuis **NEU.004** / 151225.AA