Naar huis met een infuuslijn

Centraal veneuze katheter

ijsselland ziekenhuis

Hier gaat het om u.

www.ysl.nl


Patiënteninformatie

U gaat naar huis met een infuuslijn, zodat u thuis door kunt gaan met de voorgeschreven antibiotica.
Een infuuslijn wordt ook wel een centraal veneuze katheter genoemd. In deze folder leest u wat u moet doen als uw infuuslijn losraakt.

Een medewerker van de thuiszorg zal 1x per dag bij u thuis komen voor de verzorging en voor het aansluiten van de nieuwe infuuspomp.

Van de apotheek heeft u verbandmaterialen meegekregen die nodig zijn voor de verzorging van de katheter.
Hierbij zitten ook gazen en Tegaderm wondverband dat u bij problemen nodig kunt hebben.

Wat moet u doen als uw infuuslijn losraakt?



In uitzonderingsgevallen kan uw infuuslijn losraken, bijvoorbeeld als u met de lijn ergens achter blijft hangen.

Er zijn dan 3 situaties mogelijk:

1. De verbinding tussen de katheter en de infuuslijn schiet los

Wat moet u doen?

- Zet de katheter dicht door het klipje, dat aan de katheter zit, dicht te schuiven.
- Zit er tussen de katheter en het infuussysteem een kraantje en zit dit kraantje nog aan de katheter, dan zet u deze ook dicht.
- Neem vervolgens contact op met de bij u ingeschakelde thuiszorg. U kunt het nummer vinden op het nazorgformulier dat u meekrijgt bij ontslag. Of bel het nummer dat u van de thuiszorg heeft gekregen.
- Meld duidelijk dat de infuuslijn los is en dat u de katheter al dicht heeft gezet.

2. De katheter is er gedeeltelijk uit getrokken

Wat moet u doen?

- Zet de katheter dicht door het klipje, dat aan de katheter zit, dicht te schuiven.
- Zit er tussen de katheter en het infuussysteem een kraantje en zit dit kraantje nog aan de katheter, dan zet u deze ook dicht.
- Plak de infuuslijn af met de doorzichtige pleister (Tegaderm).
- Ga vervolgens naar de spoedeisende hulp van het ziekenhuis.
- In het ziekenhuis meldt u zich bij de receptie van de spoedeisende hulp. Vertel daar:
  - dat u een patiënt bent van de cardioloog;

- dat u thuis antibiotica via een centraal veneuze katheter krijgt in verband met een endocarditis;
- dat uw centrale lijn gedeeltelijk verwijderd is.

3. De katheter is er geheel uit getrokken

Wat moet u doen?

- Druk de insteekopening van de katheter af met de gazen die meegeleverd zijn voor de verzorging van de lijn. U kunt het gaas vervolgens afplakken met de meegeleverde doorzichtige pleister (Tegaderm).
- Ga vervolgens naar de spoedeisende hulp van het ziekenhuis.
- In het ziekenhuis meldt u zich bij de receptie van de spoedeisende hulp. Vertel daar:
  - dat u een patiënt bent van de cardioloog;
  - dat u thuis antibiotica via een centraal veneuze katheter krijgt in verband met een endocarditis;
  - dat uw centrale lijn er geheel uit is.

Verder nog van belang
Deze folder ondersteunt de mondelinge informatie die u van arts of verpleegkundige krijgt. Vraag het hen als u meer wilt weten over onderzoek, operatie, gevolgen, risico's of andere behandelmogelijkheden.
Ontdek Mijn IJsselland De toegang tot uw eigen gegevens, dossier, afspraken en vragenlijsten **mijn-ijsselland**
Aanbevolen websites Betrouwbare medische informatie, aanbevolen door onze zorgverleners **aanbevolen-websites**
IJsselland Folders Al onze patiëntenfolders kunt u opzoeken en lezen in onze Folder Web App **folder app**