Onderzoek bloedvaten

(Flebografie Embolisatie Pelvic Congestion Syndrome)

ijsselland ziekenhuis

Hier gaat het om u.

www.ysl.nl

Patiënteninformatie

U ondergaat binnenkort een bloedvatenonderzoek op de afdeling Radiologie. Waarschijnlijk is hierover al het een en ander aan u verteld. In deze folder kunt u alle informatie nog eens rustig nalezen.

Heeft u na het lezen nog vragen? Bel dan naar de polikliniek waar u onder behandeling bent. U kunt ook altijd voorafgaand aan het onderzoek uw vragen stellen aan de laborant of radioloog.

Wat is een flebografie van de aderen

Met een flebografie worden de aderen afgebeeld die het bloed van de organen in het bekkengebied richting het hart afvoeren. Om de aderen zichtbaar te maken, wordt gebruik gemaakt van contrastvloeistof. Dit onderzoek wordt meestal gedaan om spataderen in het buik-/ bekkengebied op te sporen. Spataderen kunnen ontstaan doordat de kleppen, die het terugstromen van het bloed tegengaan, niet goed werken.

Bent u zwanger of twijfelt u hierover?

Röntgenonderzoek kan beter niet worden gedaan als de kans bestaat dat u zwanger bent. Bij twijfel is het beter om het onderzoek uit te voeren tot tien dagen na de eerste dag van uw menstruatie. Verander zo nodig uw afspraak. Na toediening van contrastvloeistof mag u gedurende 24 uur geen borstvoeding geven.

Contrastvloeistof

In de contrastvloeistof zit een jodiumverbinding. Jodiumhoudende stoffen kunnen een allergische reactie veroorzaken bij mensen die overgevoelig zijn voor deze stoffen. Daarom is het belangrijk te weten of u hier overgevoelig voor bent. Als dat zo is dan moet u dit bespreken met uw behandelend arts. Vertel het ook vóór het onderzoek aan de laborant of radioloog.

Voorbereiding

- Meld aan uw behandelend arts wanneer u bloedverdunnende middelen gebruikt. Het kan zijn dat u hier tijdelijk mee moet stoppen.
- Draag op de dag van de behandeling comfortabele, loszittende kleding en vooral géén strakke onderbroek.
- Draag geen sieraden.
- U mag gewoon ontbijten en medicatie innemen (indien van toepassing).

Waar meldt u zich op de dag van het onderzoek

U meldt zich op de afgesproken tijd op de afdeling Dagverpleging. Het onderzoek zelf vindt plaats op de interventiekamer op de operatieafdeling.

Het onderzoek

Om infectie te voorkomen, desinfecteert de laborant uw hals en dekt u toe met een steriel laken. Ook worden ECG-plakkers op uw borst geplakt zodat we uw hartslag in de gaten kunnen houden.

De radioloog bepaalt vervolgens met behulp van een echoapparaat waar de ader zich precies bevindt. Met een injectie wordt uw hals plaatselijk verdoofd. Dat kan even gevoelig zijn.

Daarna schuift de radioloog een dun slangetje (katheter) in de ader. Het slangetje komt ook in de buurt van uw hart. Dit kan extra prikkels geven aan uw hart waardoor soms een versnelde hartslag optreedt. Omdat dit heel kort duurt en gecontroleerd gebeurt, hoeft u zich hier geen zorgen over te maken.

Wanneer de katheter op de juiste positie is geplaatst, wordt de contrastvloeistof ingespoten. Dit geeft een warm gevoel in uw lichaam dat snel verdwijnt. Tijdens het inspuiten van de contrastvloeistof worden foto’s gemaakt.

Voor het slagen van het onderzoek is het belangrijk dat u heel stil ligt. Ook moet u soms inademen, persen, uitademen of even uw adem inhouden. Dit legt de laborant of radioloog nog aan u uit voordat de foto's worden gemaakt.

De foto's worden direct bekeken. Indien nodig vindt behandeling van slecht functionerende aderen daarna gelijk plaats via de katheter die al is ingebracht.

De behandeling (*emboliseren*) kan worden uitgevoerd met behulp van coils (*kleine ijzeren draadjes*) of een speciaal schuimmiddel waarmee een bloedvat wordt dicht gemaakt.

Als het onderzoek of de behandeling klaar is, wordt het slangetje uit het bloedvat van uw hals gehaald. Daarna wordt het gaatje enkele minuten dicht gedrukt. Rondom de plaats waar u bent geprikt, kan een blauwe plek ontstaan.

Het onderzoek zelf duurt ongeveer 1,5 uur.
Het effect van de behandeling kan pas na een aantal weken worden beoordeeld.

In een enkel geval is het zichtbaar maken van de aderen via de hals niet voldoende. In dat geval kan de katheter via de ader in de lies worden ingebracht. De procedure is verder vergelijkbaar met de procedure via de hals.

Na het onderzoek

- Na de behandeling wordt u weer teruggebracht naar de afdeling Dagverpleging.
- U blijft nog een uur op de afdeling waar u in de gaten wordt gehouden. Als alles goed gaat mag u daarna naar huis.
- U mag rechtop in bed zitten.
- U mag tot 2 dagen na het onderzoek geen zware dingen tillen, niet sporten en niet teveel traplopen.

- Het is belangrijk dat u tot drie dagen na de toediening van de contrastvloeistof veel drinkt om dit zo snel mogelijk uit te kunnen plassen.
- (Een beetje) pijn in uw buik na de behandeling is normaal. U kunt hiervoor paracetamol innemen. *Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing in de verpakking voor de juiste dosering*.
- Krijgt u koorts? Neem dan contact op met uw behandelend arts.

Mogelijke risico's en complicaties

Het onderzoek en de eventuele behandeling verlopen meestal zonder problemen. Een enkele keer treden bijverschijnselen op zoals een bloeduitstorting op de plaats waar de katheter wordt ingebracht of een overgevoeligheidsreactie op het contrastmiddel.

Hoogst zelden is de complicatie van stolselvorming. Dat kan leiden tot afsluiting van een ander bloedvat. Uw behandelend arts, die het onderzoek heeft geadviseerd, weegt altijd de geringe kans op dergelijke problemen af tegen de voordelen van de behandeling.

De uitslag van het onderzoek

De radioloog bespreekt tijdens en na de procedure het resultaat van de behandeling met u.

Bij verhindering

Als u verhinderd bent of de afspraak wilt verzetten, bel dan tenminste twee dagen voorafgaand aan het onderzoek naar de afdeling Radiologie. **De opengevallen plaats kan dan voor een andere patiënt worden gebruikt.**

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met de afdeling Radiologie, telefoonnummer **010 – 258 5975.**

U kunt uw vragen ook stellen aan een verpleegkundige, uw behandelend arts of aan degene die het onderzoek uitvoert.

Verder nog van belang
Deze folder ondersteunt de mondelinge informatie die u krijgt. Stel vragen als u meer wilt weten over onderzoek, operatie, gevolgen, risico's of andere behandelmogelijkheden.
Ontdek Mijn IJsselland De toegang tot uw eigen gegevens, dossier, afspraken en vragenlijsten **mijn-ijsselland** Bekijk onze korte animatie **Bekijk uw gegevens in Mijn IJsselland**
Persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) Website/app (gratis) waarop u al uw gezondheidsgegevens kunt bundelen en raadplegen **PGO**
Aanbevolen websites Betrouwbare medische informatie, aanbevolen door onze zorgverleners **aanbevolen-websites**
IJsselland Folders Al onze patiëntenfolders kunt u opzoeken en lezen in onze Folder Web App **folder app**