Plaatsing katheterventiel of verwijderen blaaskatheter in dagbehandeling

ijsselland ziekenhuis

Samen maken we het verschil.


ysl.nl 010 258 5000

Patiënteninformatie

Inleiding

U heeft een blaaskatheter met beenzak gekregen na een operatie of bevalling. Dat is gebeurd omdat u uw blaas zelf niet kon legen. U krijgt nu een katheterventiel.

Wat is een katheterventiel



Een katheterventiel is een soort kraantje dat wordt aangesloten op uw blaaskatheter. Wanneer een katheterventiel wordt geplaatst dan wordt de urine in uw blaas opgeslagen tot het moment waarop u het ventiel opent.

Uw blaas houdt op deze manier zijn natuurlijke eigenschappen en capaciteit.

Voordelen van een katheterventiel

- Een katheter is discreet en comfortabel in gebruik.
- Door het gebruik van een katheterventiel behoudt de blaas haar normale opslagfunctie.

Het gebruik van een katheterventiel

- Was uw handen voor en na gebruik van het katheterventiel.
- Maak de blaas leeg zodra u aandrang voelt, maar minstens om de 3 à 4 uur, volgens instructie.
- Maak de blaas ook leeg voordat u ontlasting krijgt. Dat voorkomt lekkage langs de buitenkant van de katheter bij eventueel persen.
- Open het katheterventiel door de grijze hendel naar beneden te duwen.

- Laat de urine in het toilet of opvangkan lopen. (Soms is opvangen van urine nodig om de hoeveelheid te meten.)
- Sluit het ventiel door de grijze hendel naar boven te duwen.
- Maak het flexibele slangetje schoon met lauw water.

Het vastmaken van het katheterventiel

Het katheterventiel kan in uw ondergoed worden verborgen. U kunt ook gebruik maken van een fixatiepleister om het ventiel te fixeren op een door u gekozen plaats bijvoorbeeld bovenbeen of buik. Het katheterventiel hoeft niet onder het niveau van de blaas te zitten. Dit is alleen nodig bij het leegmaken van de blaas.

Persoonlijke hygiëne
Probeer iedere dag een douche te nemen, het katheterventiel mag gewoon nat worden.

Als u ’s nachts veel urine produceert kan een beenzak worden aangesloten. De urine kan dan ’s nachts onbelemmerd aflopen.

Volg hiervoor de volgende instructies

- Was uw handen en droog ze zorgvuldig voor en na het aansluiten van de beenzak op het ventiel.
- Leeg uw blaas door het katheterventiel te openen en laat de urine in het toilet of opvangkan lopen.
- Open de verpakking van de beenzak, verwijder de beschermdop en bewaar deze.
- Duw ‘’de connector’’ van de slang van de beenzak aan het flexibele slangetje van het katheterventiel
- Laat het katheterventiel in open positie staan wanneer deze is aangesloten op de beenzak.
- Zorg dat de beenzak aan de onderkant gesloten is.
- Sluit het katheterventiel voordat u de beenzak afkoppelt.
- Hang de beenzak lager dan het niveau van uw blaas aan uw bed of leg hem in een schone emmer.

Verwijderen van de katheter in dagbehandeling

U ontvangt een oproep wanneer en waar u wordt opgenomen.
Tijdens deze dagopname wordt uw katheter verwijderd.
Ook wordt gecontroleerd of het plassen spontaan weer op gang komt nadat de blaaskatheter is verwijderd.

- Voor deze dagopname hoeft u niet nuchter te zijn. U mag normaal ontbijten.
- Het is belangrijk dat u minstens 2 liter per dag drinkt om de urineaanmaak te bevorderen.
- De verpleegkundige verwijdert de katheter bij u.
- De verpleegkundige legt uit wat de beste toilethouding is om goed uit te plassen. Soms is het nodig om op een po te plassen zodat de urinehoeveelheid kan worden gemeten.
- Na een bevalling wordt u 2x nagekatheteriseerd.
- Na een operatie controleert de verpleegkundige na de
  2^e en 3^e keer spontane plas met een echoapparaat of de blaas goed leeg is.
- Als blijkt dat u weer goed kunt plassen, kunt u dezelfde dag naar huis. Soms is het nodig om een dag langer te kijken of het plassen goed op gang komt.

Waarschuw een verpleegkundige als u het gevoel heeft dat u moet plassen, maar het niet lukt!

Controle

U krijgt een afspraak mee om over een aantal weken voor controle terug te komen bij de gynaecoloog.

Uw herstel

- De eerste dagen na het verwijderen van de blaaskatheter kan uw plasbuis geïrriteerd aanvoelen waardoor u wat vaker dan normaal naar het toilet moet.
- Ook kan het zijn dat de urine de eerste dagen wat troebeler is of dat er een beetje bloed in de urine zit. Door regelmatig goed te drinken zal de urine snel helder worden.

Wanneer moet u -na ontslag tot aan uw eerste controle- contact opnemen met het ziekenhuis

- Als u **hevige of aanhoudende buikpijn** heeft en u al enige tijd niet meer geplast heeft.
- Als u **niet meer kunt plassen** of het **gevoel heeft dat u niet goed kunt uitplassen.**
- Als u **veel en/of langdurig bloed in de urine** heeft.
- Als u **meer dan 38,5 ºC koorts** heeft met **daarbij pijn in de onderbuik of plasbuis en/of plasklachten: pijnlijk, branderig gevoel tijdens plassen, hevige aandrang en frequenter plassen.**

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met de medewerkers van de polikliniek gynaecologie, telefoonnummer **010 – 258 59 20.**

Verder nog van belang

Deze folder ondersteunt de mondelinge informatie die u van arts of verpleegkundige krijgt. Vraag het hen als u meer wilt weten over onderzoek, operatie, gevolgen, risico's of andere behandelmogelijkheden.

Ontdek Mijn IJsselland

De toegang tot uw eigen gegevens, dossier, afspraken en vragenlijsten **mijn-ijsselland**
Bekijk onze korte animatie **Bekijk uw gegevens in Mijn IJsselland**

Aanbevolen websites

Betrouwbare medische informatie, aanbevolen door onze zorgverleners **aanbevolen-websites**

IJsselland Folders

Al onze patiëntenfolders kunt u opzoeken en lezen in onze Folder Web App **folder app**

ijssel land ziekenhuis

GYN.072 / 180626.KM