Scopie bij een pouch of bij een ileorectale anastomose

Poliklinisch onderzoek

ijsselland ziekenhuis

Hier gaat het om u.

www.ysl.nl

Patiënteninformatie

1. Wat is een scopie bij een pouch of bij een ileorectale anastomose?

Op advies van uw behandelend arts krijgt u binnenkort een scopie onderzoek omdat u een pouch of een ileorectale anastomose heeft.

- Bij een **pouch** bekijkt de arts de binnenkant van de pouch en ongeveer twintig tot dertig centimeter van de dunne darm.
- Bij een **ileorectale anastomose** bekijkt de arts het deel van de dikke darm dat u nog heeft en een deel van de dunne darm.

Dit wordt nauwkeurig bekeken met een videocamera die is ingebouwd in een lange, dunne, buigzame slang:
de endoscoop.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een Maag-, Darm- en Leverarts (MDL-arts). Dit is een op dit gebied ervaren specialist die daarvoor een specifieke opleiding heeft gehad.

2. Voorbereidingen thuis

Om uw dunne darm zo goed mogelijk te kunnen beoordelen, is het belangrijk dat uw dunne darm schoon is. Daarom zijn voorbereidingen thuis noodzakelijk. Het is belangrijk dat u deze voorbereidingen goed opvolgt.

Om uw darmen voor het onderzoek goed schoon te maken, krijgt u het middel Moviprep.
Het MDL centrum stuurt het recept voor Moviprep naar uw eigen apotheek. U kunt de Moviprep daar ophalen.
In deze folder staat beschreven hoe u dit middel gebruikt.

Voorbereidingen thuis op de dag van het onderzoek:


- U kunt uw medicijnen wel gewoon innemen.
- BELANGRIJK:
  Gebruik op de dag van het onderzoek **géén vaseline** op of rond de anus. Dit is schadelijk voor de endoscoop die wordt gebruikt. Gebruik eventueel Sudocrème.
- U mag tot aan het onderzoek **alleen vloeibaar eten**.
  Dit is voeding die u door een rietje of uit een beker kunt **drinken.** Bijvoorbeeld: vla, yoghurt, soep, smoothie.

4 uur vóór het onderzoek: Moviprep drinken

- Open 1 verpakking van de Moviprep en haal zakje A en zakje B eruit.
- Giet 1 liter water in een maatbeker. Roer daarna de zakjes A én B tot de poeder is opgelost en de vloeistof helder is. Dit kan 5 minuten duren.

- Drink de klaargemaakte vloeistof - verdeeld in kleine hoeveelheden - op. Dit betekent dat u 1 glas per 10 minuten kunt drinken.
- De overige 2 verpakkingen gebruikt u niet. Deze kunt u bij het restafval weggooien.

Zorgt het laxeren en nuchter zijn voor hoofdpijn? Paracetamol met water innemen is prima.



Tips om Moviprep iets makkelijker te drinken:

- Doe er een scheutje suikervrije gele limonadesiroop doorheen.
- Drink met een rietje. Dan komt de vloeistof minder in contact met de smaakpapillen op uw tong.
- Zet de liter water, die u gaat gebruiken om de Moviprep in op te lossen, eerst een tijdje in de koelkast.
- Probeer zo veel mogelijk te bewegen. Dit stimuleert de darmen waardoor u sneller leegspoelt.

Moviprep heeft een sterk laxerende werking. Het kan nodig zijn om opvangmateriaal te gebruiken.
Gebruik ook vochtige toiletdoekjes; deze verzachten.

3. Waar meldt u zich op de dag van het onderzoek?

Op de afgesproken tijd meldt u zich met uw identiteitsbewijs bij de aanmeldzuil van het **Maag-, Darm- en Levercentrum (MDL-centrum)**, route 99. Nadat u de stappen van aanmelden heeft doorlopen, krijgt u een afspraakticket.





Hierna kunt u plaatsnemen in de wachtkamer. Daar haalt een verpleegkundige van het MDL-centrum u op.



4. Het onderzoek

Dit is een vrij eenvoudig onderzoek dat maximaal 10 minuten duurt.

- Voor het onderzoek begint, vragen wij u uw onderkleding uit te trekken en een broek van het ziekenhuis aan te trekken.
- Vervolgens wordt u op een onderzoeksbed gelegd.
  U ligt op uw linkerzijde.
- Een buigbare endoscoop wordt voorzichtig via de anus in de darm geschoven.
- Tijdens het onderzoek kunt u soms wat krampen hebben, maar na afloop van het onderzoek zult u in principe geen last meer hebben.
- Eventuele pijn en krampen in de buik verdwijnen binnen enkele uren.
- Wel kunt u nog wat last hebben van winderigheid.
  Het kan helpen om naar het toilet te gaan of om een stukje te gaan wandelen.

Risico's en complicaties van het onderzoek

- Complicaties van het onderzoek zelf komen zelden of nooit voor.

5. Na het onderzoek

Na het onderzoek kunt u meteen naar huis.
U mag in principe zelf rijden en hoeft dus niet opgehaald te worden.

De uitslag

- Voordat u het **MDL-centrum** verlaat, hoort u in het kort de uitslag van het onderzoek.
- De consequenties van de uitslag en de eventuele behandeling bespreekt u op een later tijdstip met uw behandelend arts.

6. Wanneer contact opnemen?

Neem **DIRECT** contact op met het ziekenhuis als u last krijgt van:
- helder rood bloedverlies dat niet stopt
  en/of
- acute, ernstige buikpijn

Op werkdagen tijdens kantooruren (08.30 – 16.00 uur)
Bel het MDL-centrum: **010 – 258 5180 / 5181, kies optie 2**

Na 16.00 uur en in het weekend
Centrale Receptie IJsselland Ziekenhuis
010 – 258 5000, vraag naar het avond-/weekend-/nachthoofd.

Ook als u vragen heeft, kunt u natuurlijk contact met ons opnemen via bovenstaande telefoonnummers.

Verder nog van belang
Deze folder ondersteunt de mondelinge informatie die u krijgt. Stel vragen als u meer wilt weten over onderzoek, operatie, gevolgen, risico's of andere behandelmogelijkheden.
Ontdek Mijn IJsselland De toegang tot uw eigen gegevens, dossier, afspraken en vragenlijsten **mijn-ijsselland** Bekijk onze korte animatie **Bekijk uw gegevens in Mijn IJsselland**
Persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) Website/app (gratis) waarop u al uw gezondheidsgegevens kunt bundelen en raadplegen **PGO**
Aanbevolen websites Betrouwbare medische informatie, aanbevolen door onze zorgverleners **aanbevolen-websites**
IJsselland Folders Al onze patiëntenfolders kunt u opzoeken en lezen in onze Folder Web App **folder app**

ijsselland ziekenhuis **MDL.078** /070324.AA