SGLT2 medicatie

bij diabetes mellitus

ijsselland ziekenhuis

Hier gaat het om u.

www.ysl.nl

Patiënteninformatie

Uw behandelend arts heeft u een medicijn voorgeschreven dat **SGLT2** wordt genoemd. In deze folder leest u wat dit medicijn is en wat het voor u doet.

Wat is SGLT2 en hoe werkt het

Uw nieren filteren gedurende 24 uur al uw bloed en zorgen ervoor dat belangrijke stoffen in uw bloed in balans blijven. Glucose (suiker) is één van die stoffen.

SGLT2 zorgt ervoor dat meer glucose uit het bloed wordt gehaald en met de urine verdwijnt. **Eenvoudig gezegd zorgt het medicijn SGLT2 ervoor dat u glucose uit plast.**

- Glucose trekt ook vocht aan.
  Doordat u nu extra glucose uit plast, verliest u meer vocht.
- Hierdoor wordt uw bloeddruk ook wat lager.
- U merkt ook dat u iets afvalt in gewicht.

Mogelijke bijwerkingen

1. *Urineweg infectie, infectie aan de geslachtsdelen, blaasontsteking*
   Glucose trekt bacteriën en schimmels aan. Wanneer u meer glucose uit plast en het vocht opdroogt, kan glucose achterblijven bij de urineweg uitgang. Daarom is het belangrijk om na het plassen extra aandacht te hebben voor hygiëne. Met een vochtig doekje afnemen na het plassen helpt om eventuele infecties of blaasontstekingen te voorkomen.
2. *Hypo (lage bloedglucose)*
   Bij het gebruik van bloedglucose verlagende tabletten of insuline kan een hypo (lage bloedglucose) optreden.
   Dit is eenvoudig te voorkomen of op te lossen door aanpassing van tabletten of insuline. **Doe dit altijd in overleg met uw arts**.
3. *Verzuring (ketoacidose)*
   In zeer zeldzame gevallen kan een verzuring (ketoacidose) in het bloed optreden. Dit komt doordat het lichaam geen glucose gaat verbranden maar vetten.

Hierbij kunt u o.a. klachten van sufheid, misselijkheid, braken, buikpijn, snelle ademhaling, veel dorst door uitdroging of duizeligheid krijgen die vrij plotseling optreden.

Krijgt u hier last van?
Waarschuw dan direct de (dienstdoende) arts.
Binnen kantooruren : **010 - 258 5930**
Buiten kantooruren : **Huisartsenpost**

Let op
Krijgt u een onderzoek waarbij u nuchter moet zijn?
Of bent u ziek en heeft u last van braken en diarree?
Stop dan tijdelijk met SGLT2.
Doe dit ALTIJD in overleg met degene die het medicijn heeft voorgeschreven.

Informatie over SGLT2 medicatie

- SGLT2 wordt ook door de cardioloog (hartspecialist) voorgeschreven omdat het de bloeddruk verlaagt en gunstig is voor het hart.
- SGLT2 medicatie is bekend onder de volgende namen: Canagliflozine (Invokana), Dapagliflozine (Forxiga) Empagliflozine (Jardiance), Ertugliflozine (Steglatro).
- SGLT2 is ook in combinatie met metformine in één tablet verkrijgbaar.

Controle

Bij het gebruik van SGLT2 is geen extra controle nodig.
Uw behandelend arts controleert wel uw bloeddruk en de werking van uw nieren. Het is belangrijk dat u zélf eventuele veranderingen en klachten doorgeeft aan uw behandelaar.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met uw diabetesverpleegkundige.

Bel hiervoor naar poli Interne geneeskunde,
telefoonnummer 010 - 258 5930.

Wij zijn ook bereikbaar

- via **E-consult**.
  (onderdeel van uw patiëntenportaal Mijn IJsselland).
  Klik hier voor meer informatie *of kijk op www.yslfolder.nl, zoekwoord DIV.085*.
- via de **Beter Dichtbij App**.
  Die moet u eerst activeren met een code die u van de diabetespoli ontvangt.

Verder nog van belang
Deze folder ondersteunt de mondelinge informatie die u krijgt. Stel vragen als u meer wilt weten over onderzoek, operatie, gevolgen, risico's of andere behandelmogelijkheden.
Ontdek Mijn IJsselland De toegang tot uw eigen gegevens, dossier, afspraken en vragenlijsten **mijn-ijsselland** Bekijk onze korte animatie **Bekijk uw gegevens in Mijn IJsselland**
Persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) Website/app (gratis) waarop u al uw gezondheidsgegevens kunt bundelen en raadplegen **PGO**
Aanbevolen websites Betrouwbare medische informatie, aanbevolen door onze zorgverleners **aanbevolen-websites**
IJsselland Folders Al onze patiëntenfolders kunt u opzoeken en lezen in onze Folder Web App **folder app**