Slokdarmechografie

TEE (Trans Eusophagale Echoscopie)

ijssel land ziekenhuis

Hier gaat het om u.

www.ysl.nl

Patiënteninformatie

Wat is een slokdarmechografie

Het onderzoek wordt meestal uitgevoerd als de gebruikelijke echografie via de borstkaswand onvoldoende gegevens heeft opgeleverd. Met name het functioneren en de structuur plus het mechanisme van de hartkleppen is beter te beoordelen via de slokdarmechografie.
Onderzoek via de slokdarm is ook nodig bij een vermoeden van afwijkingen aan die onderdelen van hart en grote bloedvaten, die van buitenaf niet goed kunnen worden bekeken. Doordat het hart direct achter de slokdarm ligt, zijn er weinig andere structuren die 'in de weg liggen'.

Voorbereidingen

- Het is belangrijk dat u uw **medicijnen** (als u deze gebruikt) als voorgeschreven inneemt.
- Het is aan te bevelen dat u gedurende 6 uur voor het onderzoek **nuchter** bent. Neem uw medicatie eventueel vroeger in dan normaal met een klein slokje water.

Bent u in het ziekenhuis opgenomen?

Op de verpleegafdeling wordt een infuusnaald in uw arm ingebracht. U wordt 5 tot 10 minuten vóór het onderzoek naar de Hartfunctie gebracht.

Bent u poliklinisch patiënt?

U meldt zich 1 uur vóór de afgesproken tijd op de afdeling Dagopname (B1). Daar krijgt u van de verpleegkundige een infuusnaald in uw arm. U wordt 5 tot 10 minuten vóór het onderzoek naar de Hartfunctie gebracht.

Het onderzoek

U krijgt een verdovend middel in de keel gespoten, waarna u gevraagd wordt goed te slikken.
Daarna krijgt u via de mond een vingerdikke slang ingebracht in de slokdarm. Op deze slang is een transducer gemonteerd.

Een transducer is een apparaatje dat geluidsgolven uitzendt en weer terugontvangt. De transducer komt in de slokdarm terecht, waar hij direct tegen de achterwand van het hart ligt.
Zo wordt het hart van heel nabij benaderd en kunnen scherpe beelden worden verkregen. Tijdens het onderzoek kunt u gewoon ademen.

Het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten.

Na het onderzoek

Na het onderzoek wordt u teruggebracht naar de afdeling.
Hier wordt regelmatig uw bloeddruk, pols en zuurstofgehalte in uw bloed gecontroleerd. Dit laatste gebeurt door middel van een knijpertje op de top van uw vinger.

De eerste 2 uur na het onderzoek mag u niet eten en drinken, omdat u zich door de verdovende spray in uw keel zou kunnen verslikken. U krijgt pas weer eten en drinken als de verdoving is uitgewerkt. Dit kan dus ook langer dan 2 uur na afloop van het onderzoek zijn.

U mag na dit onderzoek **niet** zelf naar huis rijden!

De uitslag van het onderzoek

- **Bent u in het ziekenhuis opgenomen?**
  Dan krijgt u de uitslag tijdens de artsenvisite op de verpleegafdeling.
- **Bent u poliklinisch patiënt?**
  Dan krijgt u de uitslag tijdens een belafspraak met de cardioloog of tijdens een afspraak op de polikliniek Cardiologie.

Wanneer contact opnemen?

Neem **DIRECT** contact op met het ziekenhuis als u last krijgt van:

- koorts en/of koude rillingen
- benauwdheid of pijn op de borst

Afsprakenlijn polikliniek cardiologie
Telefoonnummer **010 - 258 5905**

In de avond, nacht en in het weekend
Centrale Receptie IJsselland Ziekenhuis
010 – 258 50 00, vraag naar het avond-/nacht-/weekendhoofd.

Heeft u vooraf nog vragen over het onderzoek?

Bel op werkdagen tussen 08.00 en 12.00 uur de Hartfunctie:
tel. **010 – 258 5884**.

Verder nog van belang
Deze folder ondersteunt de mondelinge informatie die u krijgt. Stel vragen als u meer wilt weten over onderzoek, operatie, gevolgen, risico's of andere behandelmogelijkheden.
Ontdek Mijn IJsselland De toegang tot uw eigen gegevens, dossier, afspraken en vragenlijsten **mijn-ijsselland** Bekijk onze korte animatie **Bekijk uw gegevens in Mijn IJsselland**
Persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) Website/app (gratis) waarop u al uw gezondheidsgegevens kunt bundelen en raadplegen **PGO**
Aanbevolen websites Betrouwbare medische informatie, aanbevolen door onze zorgverleners **aanbevolen-websites**
IJsselland Folders Al onze patiëntenfolders kunt u opzoeken en lezen in onze Folder Web App **folder app**