Steroïd-injectie rond het oog

Kenacort-injectie
Celestone-injectie

ijsselland ziekenhuis

Hier gaat het om u.

www.ysl.nl

Patiënteninformatie

Deze folder geeft u informatie over de behandeling met een steroïd-injectie rond het oog. De behandeling is ook bekend als kenacort-injectie en celestone-injectie.

Steroïden

Steroïden zijn krachtige ontstekingsremmers en ontzwellers. De bekendste is prednison. Bij de injectie rond uw oog wordt geen gebruik gemaakt van prednison, maar van andere steroïden, zoals triamcinolone of betamethasone.

Doel van de behandeling

Deze behandeling wordt voor veel verschillende doelen gebruikt. Enkele van de meest voorkomende:

- Inwendige oogontsteking (uveïtis);
- Vochtophoping macula (macula oedeem) na staaroperatie;
- Macula oedeem bij veneuze occlusie, diabetes of uveïtis.

Bij **uveïtis** is het doel van de behandeling om de ontsteking te verminderen.

Bij **macula oedeem** worden de injecties gebruikt om de zwelling van het netvlies te verminderen.

De **werking** van de injectie is beperkt tot het oog, de oogleden en de oogkas. Deze injecties hebben niet de bijwerkingen buiten het oog die andere steroïden (zoals prednison) kunnen veroorzaken als ze in tabletvorm genomen worden.

Als oogontstekingen en macula oedeem onbehandeld blijven, kunnen ze leiden tot onomkeerbare schade aan het oog en tot blijvende daling van het zicht.

Voorbereiding

Neem een begeleider mee naar het ziekenhuis die u na de injectie naar huis kan brengen.

De behandeling

- Voorafgaand aan de behandeling krijgt u oogdruppels om uw oog te verdoven. Pas als de verdoving volledig is ingewerkt, kan de behandeling worden gestart.
- Tijdens de behandeling injecteert de oogarts een kleine hoeveelheid steroïden rond het oog, onder het bedekkende slijmvlies van het oog.

De behandeling – inclusief inwerktijd oogdruppels – duurt ongeveer 30 minuten.

Na de behandeling

- Na de behandeling ziet u enkele uren een beetje **waziger**.
  U kunt na de behandeling dus niet zelf deelnemen aan het verkeer. Wij vragen u daarom een begeleider mee te nemen die u na de injectie naar huis brengt.
  Op de plek waar de injectie is gezet, kunt u een **verdikking** zien. Dit ziet eruit als een soort blaar. Het vocht trekt binnen ongeveer twee dagen weg. Alleen de werkzame stof blijft dan achter op de plek rond het oog. U kunt dit zien als een soort **witte plek**. Deze plek trekt in de loop van weken weg, afhankelijk van welk medicijn u heeft gekregen.

Afhankelijk van de soort steroïden en de hoeveelheid geïnjecteerde stof, werkt de injectie enkele weken tot maanden.

Mogelijke bijwerkingen

- Als gevolg van de injectie kunnen **roodheid**, **irritatie** of een **kleine bloeding** aan de buitenkant van het oog ontstaan.
- Bij 1 op de 6 patiënten is er een **tijdelijke oogdrukstijging**. Deze stijging is in de meeste gevallen goed te behandelen met een extra oogdruppel. In zeldzame gevallen is een oogdruk operatie noodzakelijk.

- Afhankelijk van de gebruikte stof en werkingsduur kan na verloop van tijd **staar** ontstaan of kan een bestaande staar sneller toenemen. In die gevallen biedt een staaroperatie uitkomst.

Controles

- De controles na de injectie vinden plaats in het IJsselland Ziekenhuis om de oogdruk te volgen en het effect van de behandeling te beoordelen.
- Afhankelijk van het effect en de duur van het effect kan de injectie herhaald worden. Ook kan zo nodig uitgeweken worden naar andere behandelopties.

Wanneer u na de behandeling last krijgt van één of meer onderstaande klachten, neemt u dan contact met ons op:

- U gaat steeds waziger / minder scherp zien;
- U krijgt ernstige pijn aan uw oog;
- Uw oog wordt steeds roder.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen?
Dan kunt u contact opnemen met de polikliniek Oogheelkunde van het IJsselland Ziekenhuis, maandag tot en met vrijdag van 8.15 tot 16.45 uur, tel. **010 – 258 5960**.

Na 16.45 uur en in het weekend kunt u contact opnemen met de afdeling Acute Oogzorg van het Oogziekenhuis Rotterdam: tel. 010 – 401 7777.