Verwijderen K-draad bij kinderen

ijsselland ziekenhuis

Hier gaat het om u.

www.ysl.nl

Patiënteninformatie

Uw kind is geopereerd aan een fractuur die is gefixeerd met één of meerdere K-draden. Deze K-draad moet na een aantal weken, in opdracht van de behandelend arts, worden verwijderd op de gipskamer.

In deze folder informeren wij u over deze behandeling.
Tip: bekijk ter voorbereiding op de afspraak samen met uw kind het filmpje over het verwijderen van K-draad. Klik hier om het filmpje te bekijken.

Ook is het nuttig om uw kind een uur voor de afspraak een dosis paracetamol te geven. *Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing in de verpakking voor de juiste dosering.*

Wat zijn K-draden

K-draden zijn metalen pennetjes, vergelijkbaar met een cocktailprikker. K-draden zorgen ervoor dat de breuk niet kan verschuiven nadat deze tijdens de operatie is gezet. De K-draad bewaakt op die manier de stand van de gezette breuk.

Tijdens de operatie bepaalt de arts of er één of meerdere K-draden worden geplaatst. Meestal krijgt uw kind na de operatie gips, afhankelijk van de soort breuk. De K-draad is aan de buitenzijde van de huid te zien. Het uiteinde van de K-draad is omgebogen of er is een plastic buisje op het uiteinde geplaatst.



Bron: Maasstad Ziekenhuis

Het verwijderen van K-draad

Het verwijderen van de K-draad gebeurt op de gipskamer, zonder verdoving. De keuze hiervoor is afhankelijk van de locatie en de grootte van de K-draden. Het verwijderen is een korte handeling en is vergelijkbaar met het verwijderen van een pleister.
De K-draad is niet vastgegroeid aan de huid. De pijnscheut die uw kind mogelijk ervaart komt van het botvlies als de K-draad hier langs gaat bij het verwijderen.

In de meeste gevallen komt uw kind eerst naar de gipskamer voor het verwijderen van het gips. Aansluitend wordt de K-draad met behulp van een tang eruit getrokken. Over het prikgaatje wordt een pleister geplakt want in sommige gevallen bloedt de insteekopening even na.

Als u wilt, kunt u de verwijderde K-draden mee naar huis nemen. U krijgt deze dan mee in een goed afgesloten potje.
Dringend advies: laat de K-draden in het potje zitten, ze zijn zeer scherp, het is <u>geen</u> speelgoed.

Na de behandeling

- Na het verwijderen van de K-draad spreekt uw behandelend arts verder beleid met u af bijvoorbeeld of uw kind mag belasten/ oefenen of dat er opnieuw gips omheen moet.
- De eerste maand mag geen kracht worden uitgeoefend op het bot waar de pen is uitgehaald.
- Soms liggen de K-draden onder de huid verborgen.
  Deze worden dan met een poliklinische ingreep verwijderd.
  Dat hoort u na de operatie of na het eerste bezoek op de gipskamer.

Het is handig om iets mee te nemen waar uw kind mee kan worden afgeleid (bijvoorbeeld een filmpje kijken op telefoon of tablet).

Nazorg

- ✓ Plak een pleister over de insteekopening, zolang deze bloedt.
- ✓ Uw kind mag gewoon douchen – de insteekopening wel goed naspoelen en droogdeppen.
- ✓ Zolang de wondjes open zijn, mag uw kind niet zwemmen of in bad.
- ✓ Neem contact op met de gipskamer of Spoedeisende hulp wanneer de insteekopening warm, rood en/of pussig wordt.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met de gipskamer, telefoonnummer **010 – 258 5986**, bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09.00 – 16.00 uur.

Verder nog van belang
Deze folder ondersteunt de mondelinge informatie die u krijgt. Stel vragen als u meer wilt weten over onderzoek, operatie, gevolgen, risico's of andere behandelmogelijkheden.
Ontdek Mijn IJsselland De toegang tot uw eigen gegevens, dossier, afspraken en vragenlijsten **mijn-ijsselland** Bekijk onze korte animatie **Bekijk uw gegevens in Mijn IJsselland**
Persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) Website/app (gratis) waarop u al uw gezondheidsgegevens kunt bundelen en raadplegen **PGO**
Aanbevolen websites Betrouwbare medische informatie, aanbevolen door onze zorgverleners **aanbevolen-websites**
IJsselland Folders Al onze patiëntenfolders kunt u opzoeken en lezen in onze Folder Web App **folder app**