Vrij leggen van een tand

ijsselland ziekenhuis

Hier gaat het om u.

www.ysl.nl

Patiënteninformatie

Binnenkort kom je naar de kaakchirurg voor het vrij leggen van een tand. De kaakchirurg heeft met je besproken waarom deze behandeling wordt uitgevoerd.

In deze folder kun je de informatie over deze behandeling nog eens rustig nalezen.



Een niet-doorgebroken tand

Bij een aantal jongens en meisjes van 12 jaar en ouder breekt de hoektand niet spontaan door. De orthodontist verwijst je dan door naar de kaakchirurg.

In de verwijzing wordt gevraagd om de hoektand, die meestal in het gehemelte ligt, vrij te leggen en eventueel te voorzien van een gouden kettinkje of bracket met metaaldraadje, die aan de beugel wordt vastgemaakt. De behandeling bij de orthodontist kan hiermee mogelijk tot ¾ jaar worden verminderd.

Een dergelijke behandeling is natuurlijk niet leuk en een gehemelteprik is nogal gevoelig. Na de behandeling is er wat ongemak gedurende 2 of 3 dagen.

De behandeling bij de kaakchirurg inclusief de eventuele röntgenfoto wordt door de zorgverzekeraar vergoed.

Wanneer de tand of kies nog verstopt zit in de kaak legt de kaakchirurg deze vrij en ligeert de tand of kies. Ligeren is het aanbrengen van een metalen slotje op de betreffende tand of kies zodat de orthodontist deze onder spanning kan laten zakken tot de juiste plaats.

Voorbereiding op de behandeling

Plan geen belangrijke dingen op de dag van de behandeling en de dag erna dus stel sporten en etentjes even uit.

Meestal heb je ongeveer twee tot drie dagen last na een behandeling. Daarna gaat het geleidelijk aan beter.

Zorg dat er een koelelement klaar ligt als je thuis komt zodat je kunt koelen.

Je kunt eventueel een uur voor de behandeling 1 of 2 tabletten paracetamol innemen (lees de bijsluiter voor de dosering).

Waar meld je je op de dag van behandeling

Je meldt je met je identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil in onze centrale hal. Nadat je de stappen van aanmelden hebt doorlopen, krijg je een afspraakticket. Daarop vind je het tijdstip van je afspraak en het routenummer van de polikliniek of afdeling waar je moet zijn.

De behandeling

Op de plaats van de verstopte tand wordt een plaatselijke verdoving gegeven. Nadat de verdoving goed is ingewerkt, kan de behandeling beginnen. Hiervoor wordt je afgedekt met een doek.

Wanneer het goed verdoofd aanvoelt, wordt een luikje in het tandvlees gemaakt waarna de tand wordt vrijgemaakt van het weefsel rondom. Dat maakt geluid maar mag geen pijn doen.

Wanneer de tand vrij ligt, wordt de bracket erop vast gelijmd. Daarna wachten we even tot de lijm goed droog is.



De bracket is voorzien van een draadje dat wordt vastgemaakt aan de beugel (als deze al is geplaatst door de orthodontist). Daarna wordt het gehecht met een hechting die vanzelf oplost. Dit kan 2 weken duren.

De orthodontist kan dan de bracket aan de beugel vastmaken en de tand op de juiste plaats begeleiden.

Het is aan te raden om kort na de behandeling een afspraak met de orthodontist te maken.

Mogelijke complicaties

De eerste uren na de behandeling kan de wond nog een beetje bloeden. Dit veroorzaakt rood gekleurd speeksel en gaat vanzelf over. Probeer het met rust te laten en er niet aan te zuigen.

Bij een nabloeding komt helder rood bloed direct uit de wond in de mond. Dit gebeurt echter zelden.

Zwelling

Door de behandeling kan je lip gaan zwellen.
Je kunt de buitenkant van je lip koelen met een koelelement of bijvoorbeeld een washandje gevuld met een plastic zakje met ijsblokjes of diepvrieserwtjes.

Als de zwelling na drie dagen blijft toenemen, neem dan contact met ons op.

Wanneer een zwelling ontstaat in het gehemelte

- was dan je handen en
- druk met je duim tegen het gehemelte, zodat het vocht er onderuit kan.

Mocht je het niet vertrouwen, neem dan contact met ons op.

Pijn

De verdoving is na enkele uren uitgewerkt. Wees tot die tijd voorzichtig met warme dranken of eten want je lip is dan nog gevoelloos.

Napijn is goed te verhelpen met een pijnstiller. Paracetamol is meestal afdoende. Lees voor gebruik de bijsluiter voor de dosering.

Verzorging

Laat de wond de eerste dag met rust, dus niet spoelen.

Je kunt je tanden gewoon poetsen maar het wondgebied de eerste vier dagen niet poetsen. Daarna mag je het wondgebied met een zachte tandenborstel poetsen.

Het kan zijn dat de hechting hierdoor los gaat, dat is na vier dagen geen probleem.

Heb je nog vragen?

Neem dan contact op met de medewerkers van de polikliniek Mond-, Kaak en Aangezichtschirurgie (MKA), telefoonnummer **010 – 258 5945**.

Verder nog van belang

Deze folder ondersteunt de mondelinge informatie die u krijgt. Stel vragen als u meer wilt weten over onderzoek, operatie, gevolgen, risico's of andere behandelmogelijkheden.

Ontdek Mijn IJsselland

De toegang tot uw eigen gegevens, dossier, afspraken en vragenlijsten **mijn-ijsselland**

Bekijk onze korte animatie **Bekijk uw gegevens in Mijn IJsselland**

Is uw kind patiënt? Vraag op **www.digid.nl** voor uw kind een eigen DigiD aan.

Aanbevolen websites

Betrouwbare medische informatie, aanbevolen door onze zorgverleners **aanbevolen-websites**

IJsselland Folders

Al onze patiëntenfolders kunt u opzoeken en lezen in onze Folder Web App **folder app**