Wortelpuntbehandeling

ijsselland ziekenhuis

Hier gaat het om u.


www.ysl.nl

Patiënteninformatie

Binnenkort komt u naar de kaakchirurg voor een wortelpuntbehandeling. De kaakchirurg heeft met u besproken waarom deze behandeling wordt uitgevoerd.

In deze folder kunt u de informatie over deze behandeling nog eens rustig nalezen.

Wortelpuntontsteking



Wanneer de zenuw in een tand of kies afsterft, bijvoorbeeld na een ongeluk, door een gaatje of door het maken van een grote vulling of kroon, voert de tandarts een wortelkanaalbehandeling uit.

Maar het is niet altijd mogelijk de wortelkanalen van de tand of kies volledig te behandelen, bijvoorbeeld door een kromme wortel of meerdere, splitsende, kleine kanaaltjes.

Wanneer het wortelkanaal niet helemaal schoon is, kan een ontsteking aan de wortelpunt blijven bestaan. Dit kan ook langere tijd na een wortelkanaalbehandeling ontstaan.

Soms werkt de ontsteking zich een weg naar de mondholte, waarbij een soort puistje op het tandvlees kan ontstaan (fistel). In de meeste gevallen ontstaan geen klachten, maar de ontsteking gaat niet vanzelf weg en kan bijvoorbeeld opspelen in perioden van een verminderde weerstand.

De kaakchirurg kan het puntje van de tand of kies samen met de ontsteking verwijderen.

Waar meldt u zich op de dag van uw behandeling

U meldt zich met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil in onze centrale hal. Nadat u de stappen van aanmelden heeft doorlopen, krijgt u een afspraakticket. Daarop vindt u het tijdstip van uw afspraak en het routenummer van de polikliniek of afdeling waar u moet zijn.

De behandeling

De behandeling vindt plaats onder plaatselijke verdoving, net als bij de tandarts. Wanneer u tijdens de behandeling het gevoel heeft dat de verdoving onvoldoende is, kunt u dit direct aangeven.

Zodra de verdoving is ingewerkt, maakt de kaakchirurg een klein sneetje in het tandvlees en schuift het tandvlees wat opzij. Vervolgens wordt met een boortje wat ruimte gemaakt in het kaakbot om de ontsteking te kunnen bereiken.

Het ontstekingsweefsel wordt verwijderd en het puntje van de wortel wordt met een boortje ingekort. De ingekorte wortel wordt afgesloten met een vulmateriaal.

Vervolgens wordt de wond gehecht. De hechtingen lossen na ongeveer 10-14 dagen vanzelf op.

Na de behandeling heeft u nog een aantal uren een verdoofd gevoel in uw mond. Dit gevoel verdwijnt vanzelf weer als de verdoving uitwerkt.

Het succes van de behandeling wordt gecontroleerd en u krijgt een afspraak mee voor over een half jaar. Bij die afspraak wordt een controle röntgenfoto gemaakt en bekeken of het kaakbot is geheeld in het gebied waar eerst de ontsteking zat.

Mogelijke complicaties

Bij het inkorten van een wortelpunt van een kies in uw bovenkaak kan een open verbinding ontstaan tussen de mondholte en de neusbijholte. Dit kan gebeuren wanneer de wortels van de kies in de neusbijholte uitsteken of als het kaakbot op die plek heel dun is. De kaakchirurg zal deze verbinding sluiten.

Hierna is het belangrijk om 7-10 dagen niet te snuiten of te blazen. U mag wel uw neus ophalen.

Zwelling

Door de ingreep kan uw wang flink opzwellen.
Deze zwelling is op de derde dag na de ingreep het grootst en slinkt daarna weer langzaam. Soms kan ook sprake zijn van een bloeduitstorting.

Als u het prettig vindt, mag u de wang koelen met een koelelement of bijvoorbeeld een washandje gevuld met een plastic zakje met ijsblokjes of diepvrieserwtjes.

Om extra zwelling te voorkomen, kunt u het beste de zon vermijden.

Wanneer de zwelling na drie dagen blijft toenemen, neem dan contact met ons op.

Nabloeding

De eerste uren na de ingreep kan de wond nog een beetje bloeden. Dit veroorzaakt roodgekleurd speeksel en gaat vanzelf weer over. Probeer het wondje in uw mond met rust te laten en er niet aan te zuigen.

Bij een nabloeding komt helderrood bloed in de mond.
Handel dan als volgt.

- Maak een prop van gazen, een (schone) stoffen zakdoek of theedoek.
- Leg deze tegen de wond aan.
- Druk dit een half uur goed aan.

Kijk pas na een half uur of het bloeden is gestopt.
Zo niet, herhaal dan bovenstaande stappen.

Als u zich zorgen maakt of de bloeding neemt na een aantal uren alleen maar toe, neem dan contact met ons op.

Waar op te letten ná de behandeling

Pijn

De verdoving is pas na enkele uren uitgewerkt. Tot die tijd moet u oppassen met hete dranken/heet voedsel en voor het bijten op uw gevoelloze lip/tong/wang.

Napijn is goed te bestrijden met pijnstillende medicatie.
De kaakchirurg kan u hierin adviseren.
Neem de medicatie in volgens recept en lees altijd de bijsluiter van de medicatie.

Verzorging

Laat het wondje de eerste dag met rust, dus niet spoelen en wees voorzichtig met het poetsen van de tanden in deze regio.

U mag de eerste dagen na de ingreep niet roken.

Wees voorzichtig met alcohol (zeker in combinatie met medicatie).

U mag verder alles eten en drinken, maar wees de eerste dagen voorzichtig met het wondgebied.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met de medewerkers van de polikliniek Mond-, Kaak en Aangezichtschirurgie (MKA), telefoonnummer **010 – 258 5945**.

Verder nog van belang
Deze folder ondersteunt de mondelinge informatie die u krijgt. Stel vragen als u meer wilt weten over onderzoek, operatie, gevolgen, risico's of andere behandelmogelijkheden.
Ontdek Mijn IJsselland De toegang tot uw eigen gegevens, dossier, afspraken en vragenlijsten **mijn-ijsselland** Bekijk onze korte animatie **Bekijk uw gegevens in Mijn IJsselland**
Aanbevolen websites Betrouwbare medische informatie, aanbevolen door onze zorgverleners **aanbevolen-websites**
IJsselland Folders Al onze patiëntenfolders kunt u opzoeken en lezen in onze Folder Web App **folder app**